

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)



Isotretinoína (Acnemin® 10 y 20 mg; Dercutane® 5, 10, 20 y 40mg; Flexresan® 10 y 20 mg; Isdiben® 5, 10, 20 y 40 mg; Isoacne® 5, 10, 20 y 40 mg)

Cápsulas de 5mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg

Caja con 50 cápsulas en las dosis más bajas, cajas con 30 y 50 cápsulas en la dosis de 40mg

Conservación: Conservar las cápsulas en los blisters y éstos, a su vez, en las cajas de cartón para protegerlos de la luz y de la humedad.



POSOLOGIA

- Isotretinoína cápsulas se administrará por vía oral.
- La dosis indicada es según prescripción médica.

¿CÓMO se debe TOMAR ISOTRETINOINA?

- Isotretinoína cápsulas debe tomarse con las comidas, o inmediatamente después.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de la toma.
- Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua. En caso que no pueda tragar, las cápsulas pueden masticarse o bien pincharse y su contenido mezclado con algún alimento de contenido graso.
- Mantenga siempre el mismo horario.

¿QUÉ hacer si.....?

- Si ha olvidado una dosis, adminístrela lo antes posible. Si han transcurrido más de 6 horas espere a la siguiente toma y no tome la dosis olvidada (nunca doble la dosis).
- Si vomita no repita la dosis.
- Si toma más dosis de la recomendada, avise a su médico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, acuda a su médico o consulte al Servicio de Información Toxicológica (Tfno: 91 562 04 20).

¿Cuándo NO debe tomar ISOTRETINOINA?

- Si es alérgico a isotretinoína, vitamina A, parabenos, soja o cacahuets, y también si es alérgico al rojo cochinilla A (en cápsulas de 10 y 20mg) o al amarillo anaranjado S (cápsulas de 40mg).
- Si está embarazada.

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

PRECAUCIONES

- Si tiene enfermedad hepática grave, hiperlipidemia, trastorno psiquiátrico u ocular.
- Si ha sufrido alguna enfermedad que afecte de manera importante a la absorción intestinal o si se ha sometido a una reducción quirúrgica de intestino o estómago.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.
- Protéjase del sol con cremas con filtros físicos con protección superior a 15.

INTERACCIONES

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Antibióticos: tetraciclinas.
- Vitaminas: vitamina A.
- Otro: queratolíticos, exfoliantes

EFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos más frecuentes que no significa que aparezcan en todos los pacientes son:

- Depresión
- Dolor abdominal
- Náuseas y vómitos: hacer comidas pequeñas y frecuentes, y enjuagarse la boca con frecuencia pueden ayudar.
- Boca seca e irritación de la boca: un buen cuidado bucal puede ayudar. Además el utilizar cepillos de dientes suaves y enjuagarse la boca puede ayudar. No usar enjuagues bucales con alcohol.
- Hipertrigliceridemia, incremento del colesterol sérico
- Anemia
- Irritación nasal y epistaxis
- Irritación cutánea, con dermatitis, sequedad de piel, fotosensibilidad y prurito.
- Irritación de los ojos y menor visión nocturna
- Debilidad ósea y especialmente en niños, dolor de articulaciones y de espalda.

Avise rápidamente a su médico si tiene:

- Dificultad para respirar.
- Fiebre alta > 38 °C.
- Sangre en la orina, heces negras o hematomas importantes.
- Aumento rápido de peso.

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

CONSERVACIÓN

- Conservar en el envase original a temperatura ambiente.
- Proteger de la luz y la humedad (guardar en un lugar seco).

CADUCIDAD

- No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital o en una Oficina de Farmacia, con la receta que le hará su médico de

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

este centro.

REFERENCIAS

- Ficha técnica del Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS-CIMA [base de datos en Internet]. Madrid, España: Agencia española de medicamentos y productos sanitarios(AEMPS). Disponible en: <https://sinaem4.agemed.es/consaem/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm>
- Micromedex Healthcare® Series [base de datos en Internet]. Greenwood Village, Colorado: Thomson MICROMEDEX DRUGDEX® System. 1974-2012. Disponible en: <http://www.thomsonhc.com/home/dispatch> Drugdex ® de Thomson Micromedex ® Healthcare Series.
- Nahata MC, Pai VB, and Hipple TF. Pediatric Drug Formulations. 4th ed. Cincinnati, OH: Harvey Whitney Books Co: 2000
- Ficha técnica del Centro de Información online de Medicamentos del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos- BOT Plus [base de datos en Internet]. Madrid, España: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Disponible en: <https://botplusweb.portalfarma.com/>
- Taketomo CK, Hodding JH, Kraus DM. Pediatric and Neonatal Dosage Handbook. 18 th ed. American Pharmacists Association, editor. Hudson (OH): Lexi Com; 2010.

FECHA DE ELABORACIÓN/ FECHA DE REVISION

Diciembre 2013/Febrero 2014