

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)



Sociedad Española
de Farmacia Hospitalaria



Topotecan 1 mg/mL SOLUCIÓN ORAL (Fórmula Magistral)

Solución Oral 1 mg/mL (excipientes: agua para inyectables) en frasco o jeringas monodosis.

Conservación: temperatura ambiente protegido de la luz.

Caducidad: 28 días.



POSOLOGIA

- Topotecan solución oral se administra por vía oral.
- Su médico le indicará la cantidad de medicamento que debe tomar cada día y la frecuencia.

¿CÓMO se debe TOMAR TOPOTECAN SOLUCIÓN ORAL?

- Topotecan solución oral puede tomarse con o sin alimentos.
- Puede mezclar la dosis con algo de zumo de naranja o manzana para la administración.

¿QUÉ hacer si.....?

- Si ha olvidado una dosis, adminístrela lo antes posible. Si han transcurrido más de 12 horas espere a la siguiente toma y no tome la dosis olvidada (nunca doble la dosis).
- Si vomita después de tomar una dosis, no repita la toma. Informe a su médico de las dosis perdidas en la próxima visita.
- Si toma más dosis de la recomendada, avise a su médico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, acuda a su médico o consulte al Servicio de Información Toxicológica (Tfno.: 91 562 04 20)

¿Cuándo NO debe tomar TOPOTECAN SOLUCIÓN ORAL?

- Si es alérgico a topotecan .

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

- Si está embarazada o en período de lactancia.
- Si su recuento de células sanguíneas es muy bajo.

PRECAUCIONES

- Si tiene enfermedad hepática o renal. Puede ser necesario ajustar su dosis.
- Si ha sufrido alguna enfermedad que afecte de manera importante a la absorción intestinal.
- Si piensa quedarse embarazada o piensa ser padre.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.

INTERACCIONES

- Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, incluso los adquiridos sin receta o cualquier producto a base de plantas medicinales.

EFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos más frecuentes que no significa que aparezcan en todos los pacientes son:

- Sensación de debilidad general y cansancio (anemia temporal).
- Moratones o sangrado no justificados al reducir el número de plaquetas. Tenga cuidado en realizar actividades de riesgo como manejar utensilios cortantes.
- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Debe tomar medidas higiénicas.
- Náuseas y vómitos
- Diarrea, estreñimiento y dolor de estómago.
- Inflamación y úlceras en la boca, lengua y encías.
- Pérdida de pelo.

Avise rápidamente a su médico si tiene:

- Más de 3 episodios de diarrea en un día.
- Una reacción alérgica grave (Dificultad para respirar, enrojecimiento de la piel)
- Signos de infección (Tos, escalofríos, fiebre alta > 38 °C)
- Sangre en la orina, heces negras o hematomas importantes.

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

CONSERVACIÓN

- Conservar a temperatura ambiente (20-25°C)
- Mantenga en su envase original protegido de la luz.

CADUCIDAD

Programa de Información al Paciente Pediátrico y Cuidadores sobre Quimioterapia Oral

Grupo Español de Farmacia Pediátrica (GEFP)
Grupo de Farmacia Oncológica de la SEFH (GEDEFO)
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH)

- No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

- Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.
- Esta medicación deberá ser dispensada por el Servicio de Farmacia de su Hospital, con la receta que le hará su médico especialista (fórmula magistral).

REFERENCIAS

- Ficha técnica del Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS-CIMA [base de datos en Internet]. Madrid, España: Agencia española de medicamentos y productos sanitarios(AEMPS). Disponible en:
<https://sinaem4.agemed.es/consaem/fichasTecnicas.do?metodo=detalleForm>
- Micromedex Healthcare® Series [base de datos en Internet]. Greenwood Village, Colorado: Thomson MICROMEDEX DRUGDEX® System. 1974-2012. Disponible en: <http://www.thomsonhc.com/home/dispatch> Drugdex ® de Thomson Micromedex® Healthcare Series.
- Nahata MC, Pai VB, and Hipple TF. Pediatric Drug Formulations. 4th ed. Cincinnati, OH: Harvey Whitney Books Co: 2000
- Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos. Catálogo de Medicamentos 2012. Madrid: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.
- Taketomo CK, Hodding JH, Kraus DM. Pediatric and Neonatal Dosage Handbook. 18th ed. American Pharmacists Association, editor. Hudson (OH): Lexi Com; 2010.

COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Solución oral de topotecan 1 mg/mL (20 ml):

Hycamtin® 4 mg vial20 mg
Agua para inyectables.....20 mL

FECHA DE ELABORACIÓN/ FECHA DE REVISION

Septiembre 2013/Febrero 2014