

RIBOFLAVINA 25 MG/ML SOLUCIÓN ORAL

FORMA FARMACÉUTICA:

Soluciones

CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN

100 ml

COMPOSICIÓN:

RIBOFLAVINA SODIO FOSFATO	3.175g
AGUA CONSERVANTE SIN	
PROPILENGLICOL	50ml
JARABE SIMPLE c.s.p.	100ml

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía oral

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:

Este medicamento contiene como principio activo riboflavina, que es la vitamina B2. La riboflavina está indicada en la prevención y tratamiento de la deficiencia de riboflavina, en el tratamiento de la deficiencia de NADH deshidrogenasa (ubiquinona), y en el tratamiento de la aciduria glutárica tipo 2.

La dosis de riboflavina debe ser individualizada, por lo que su médico establecerá la dosis adecuada para usted o su hijo/a y realizará los ajustes que considere oportunos. Siga estrictamente la pauta indicada por su médico en cuanto a las dosis y al intervalo de administración. Consulte con su médico o farmacéutico si tiene dudas.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Se recomienda tomar este medicamento preferentemente con las comidas para favorecer su absorción. Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como se acuerde, salvo que quede poco tiempo para la próxima administración, en ese caso ignore la dosis olvidada y siga con la pauta recomendada.

SOBREDOSIS:

Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

Consulte con su médico si usted o su hija está embarazada o en período de lactancia antes de tomar este medicamento. Riboflavina atraviesa la placenta y se encuentra en leche materna. Los requerimientos de riboflavina están aumentados durante el embarazo y la lactancia.

USO EN NIÑO:

Ver apartado indicaciones y posología

EFFECTO SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:

No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener cuidado al realizar estas tareas hasta que conozca cómo tolera el tratamiento.

OTRAS:

Mantener los medicamentos fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a algunos de los componentes de la fórmula.

INTERACCIONES:

No se conocen interacciones farmacológicas relevantes.

REACCIONES ADVERSAS:

La aparición de reacciones adversas es excepcional. Con una frecuencia no definida la riboflavina puede colorear la orina de amarillo-naranja. Si se observa cualquier otra reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

CONSERVACION:

Conservar en nevera (2°C-8°C), protegido de la luz y de la humedad. Mantener el envase bien cerrado.

PLAZO DE VALIDEZ:

En condiciones óptimas de conservación el plazo de validez es de 90 días en nevera (2°C-8°C). Una vez abierto el envase, desechar a los 30 días.

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:

28/10/2025