

GABAPENTINA 50mg/ml SOLUCIÓN ORAL

FORMA FARMACÉUTICA:

Soluciones

CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN

100 ml

COMPOSICIÓN:

GABAPENTINA	5000mg
SACARINA SÓDICA	100mg
AGUA CONSERVANTE SIN	
PROPILENGLICOL	50ml
JARABE SIMPLE c.s.p.	100ml

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía oral

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:

INDICACIONES

Gabapentina pertenece a un grupo de medicamentos que se utilizan para tratar la epilepsia y el dolor neuropático periférico (dolor crónico causado por daño en los nervios).

POSOLOGÍA:

La dosis de gabapentina debe ser individualizada, por lo que su médico establecerá la dosis adecuada para usted o su hijo/a y realizará los ajustes que considere oportunos. Siga estrictamente la pauta indicada por su médico en cuanto a la dosis y al intervalo de administración. Consulte con su médico o farmacéutico si tiene dudas.

No interrumpa de forma brusca o demasiado rápido el tratamiento con gabapentina, debido al riesgo de sufrir reacciones adversas o bien de empeoramiento de su enfermedad. Si desea dejar de tomar gabapentina, hágalelo con su médico en primer lugar. Su médico le indicará cómo proceder. Si va a dejar el tratamiento, debe hacerse de forma gradual durante un mínimo de una semana.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Este medicamento se puede tomar con o sin alimentos. Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como se acuerde, salvo que quede poco tiempo para la próxima administración, en ese caso ignore la dosis olvidada y siga con la pauta recomendada.

SOBREDOSIS:

Los síntomas debidos a intoxicación pueden incluir pérdida del conocimiento, mareo, visión doble, dificultad para hablar, adormecimiento y diarrea. En caso de sobredosis o ingestión accidental, acuda inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, Tfno: 91 562 04 20.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

Consulte con su médico si usted o su hija está embarazada o en periodo de lactancia antes de utilizar este medicamento. Gabapentina no debe administrarse durante el embarazo ni en el periodo de lactancia a menos que su médico se lo haya indicado.

USO EN NIÑO:

Ver indicaciones y posología.

EFFECTO SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:

No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener cuidado al realizar estas tareas hasta que conozca cómo tolera el tratamiento.

OTRAS:

Contacte con su médico inmediatamente si usted o su hijo/a desarrolla síntomas como dolor de estómago persistente, se siente mareado o se marea, ya que pueden ser síntomas de pancreatitis aguda (páncreas inflamado).

Este medicamento contiene sacarosa (un tipo de azúcar). Los pacientes con diabetes mellitus deben tener en cuenta que este medicamento contiene por cada mililitro una cantidad aproximada de 0,35 gramos de sacarosa. Si su médico le ha indicado que usted o su hijo/a padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento. Este medicamento puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) debido a los parahidroxibenzoatos de metilo y propilo del agua conservante que contiene.

Advertencia: los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES:

Usted o su hijo/a no debe tomar gabapentina solución oral si es alérgico a gabapentina o alguno de los componentes de este medicamento (ver composición).

PRECAUCIONES:

- Pacientes con alteración de la función renal.
- Pacientes con ideas autolíticas previas o ideación suicida.
- Este medicamento contiene sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

INTERACCIONES:

Comuniqué a su médico o farmacéutico si usted o su hijo/a está utilizando recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento incluso los adquiridos sin receta médica. Gabapentina puede afectar el efecto de otros medicamentos, entre los que se encuentran los opioides (como morfina) y los antiácidos que contienen aluminio o magnesio, lo que puede requerir que su médico le prescriba una dosis diferente.

REACCIONES ADVERSAS:

Al igual que todos los medicamentos, gabapentina puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufren. Deje de tomar gabapentina y busque atención médica inmediatamente si nota cualquiera de estos síntomas:

- Parches enrojecidos y sin relieve con forma de diana o circulares en el tronco, a menudo con ampollas en el centro; descamación de la piel, úlceras en la boca, garganta, nariz, genitales y ojos. Estas erupciones cutáneas graves pueden venir precedidas de fiebre y síntomas parecidos a la gripe.
- Erupción expandida, temperatura corporal alta y aumento del tamaño de los ganglios linfáticos.

Contacte con su médico inmediatamente si experimenta cualquiera de estos síntomas: urticaria, dificultad para respirar, hinchazón de labios, garganta y lengua e hipotensión, dolor de estómago persistente, vómitos y náuseas ya que pueden ser síntomas de pancreatitis aguda.

Contacte con su médico si experimenta: coloración amarillenta de la piel o del blanco de los ojos, hematomas o sangrado inusual, cansancio o debilidad grave, dolor muscular inesperado o infecciones frecuentes.

Otros efectos adversos descritos como muy frecuentes son: infecciones virales, somnolencia, mareos, dificultad en la coordinación de movimientos, sensación de cansancio y fiebre. Si se observa cualquier otra reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

CONSERVACION:

Conservar refrigerado (2-8°C) protegido de la luz y la humedad. Conservar el envase bien cerrado. Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ:

Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 60 días desde su elaboración y un periodo de validez máximo de 30 días una vez abierto. No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:

19/08/2025