

CAPTOPRIL 1 MG/ML SOLUCIÓN ORAL

FORMA FARMACÉUTICA:

Soluciones

CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN

100 ml

COMPOSICIÓN:

CAPTOPRIL	0.1g
EDETATO DE DISODIO	0.01g
SODIO BENZOATO	0.1g
SORBITOL 70%	28.7g
AGUA PURIFICADA c.s.p.	100ml

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía oral

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:

Captoprilo es un medicamento que actúa dilatando/relajando los vasos sanguíneos y reduciendo la presión arterial. Se utiliza para el tratamiento de la presión arterial elevada (hipertensión) y de la insuficiencia cardíaca (el corazón no bombea la sangre de manera adecuada).

Su médico establecerá de manera individualizada la dosis adecuada para usted o su hijo/a y realizará los ajustes oportunos. Siga estrictamente la pauta indicada y consulte a su médico o farmacéutico si tiene dudas.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Los alimentos pueden interferir en la absorción de captoprilo, por lo que se recomienda que este medicamento se administre separado de las comidas siempre que sea posible (por ejemplo 1 hora antes o 2 horas después).

SOBREDOSIS:

En caso de tomar más cantidad de medicamento de la debida, el síntoma más probable es una sensación de mareo debida a un descenso excesivo de la tensión arterial. Si se produce una intoxicación o sobredosis debe acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica (teléfono 915620420).

EMBARAZO Y LACTANCIA:

- Embarazo: este medicamento está contraindicado en embarazadas (especialmente durante el segundo y el tercer trimestre).
- Lactancia: a pesar de que las concentraciones de captoprilo en leche materna parece ser irrelevantes, no se recomienda su uso durante el período de lactante, especialmente en el caso de niños prematuros o durante las primeras semanas después del parto.

Debe de informar a su médico antes de comenzar a tomar este medicamento.

USO EN NIÑO:

Aceptado su uso en niños

EFFECTO SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:

Puede alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar maquinaria peligrosa al inicio del tratamiento o en una modificación de dosis.

OTRAS:

No se han descrito otras precauciones especiales. Advertencia: los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES:

No debe tomar este medicamento si

- Es alérgico al principio activo (captoprilo), a algún excipiente del medicamento o a otro principio activo del mismo grupo, llamados IECA.
- Si tiene antecedentes de angioedema asociado a un tratamiento previo con medicamentos del mismo grupo.
- Padece edema angioneurótico hereditario o idiopático.
- Si tiene diabetes y/o insuficiencia renal y toma algún medicamento que contenga aliskireno para tratar la tensión arterial.
- Durante el segundo y tercer trimestre de embarazo.

PRECAUCIONES:

Este medicamento contiene benzoato de sodio, por lo que puede incrementar el riesgo de ictericia en los recién nacidos (coloración amarillenta de la piel y los ojos). En su composición también hay sorbitol, una fuente de fructosa que provoca un ligero efecto laxante en todos los pacientes y puede provocar malestar gastrointestinal en cantidades elevadas. Consulte a su médico antes de tomar este medicamento si padece una intolerancia a ciertos azúcares o se le ha diagnosticado una intolerancia hereditaria a la fructosa (IHF).

Es necesario realizar un ajuste posológico en función del grado de funcionalidad renal.

INTERACCIONES:

Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando algún otro medicamento, incluso si no necesita receta o es un producto de herbolario. Algunos de los fármacos cuya toma puede verse afectada por captoprilo son: diuréticos (usados para aumentar el volumen de orina), antiinflamatorios, antihipertensivos, antidiabéticos o suplementos de potasio y litio (utilizado para tratar algunos tipos de depresión).

REACCIONES ADVERSAS:

Se han observado los siguientes efectos adversos (aunque no todas las personas los sufran): mareos, dolor de cabeza, tos persistente, vómitos, picor, erupción en la piel, anorexia (pérdida de apetito), hipotensión (disminución de la presión arterial), taquicardia (aumento del ritmo cardíaco), alteraciones en la eliminación de orina, hinchazón de los brazos, las piernas, la cara, la lengua y/o la garganta.

CONSERVACION:

Se debe conservar a temperatura ambiente (máximo 25°C) o en nevera. El envase debe estar bien cerrado y protegido de la luz y la humedad. Mantenga este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ:

Esta fórmula tiene una validez de 90 días desde su elaboración y de 30 días una vez abierta. No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:

18/12/2021