

TIAMINA CLORHIDRATO 100 mg/ml solución oral

FORMA FARMACÉUTICA:

Soluciones

CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN

100 ml

COMPOSICIÓN:

TIAMINA CLORHIDRATO	10g
AGUA CONSERVANTE SIN	
PROPILENGLICOL	50ml
JARABE SIMPLE c.s.p.	100ml

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía oral

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:

Este medicamento contiene como principio activo tiamina, que es la vitamina B1. La tiamina está indicada en el tratamiento y prevención de su deficiencia, y en el tratamiento de algunas enfermedades metabólicas (enfermedad de la orina con olor a jarabe de arce, déficit de piruvato deshidrogenasa, acidosis láctica congénita).

La dosis de tiamina debe ser individualizada, por lo que su médico establecerá la dosis adecuada para usted o su hijo/a y realizará los ajustes que considere oportunos. Siga estrictamente la pauta indicada por su médico en cuanto a las dosis y al intervalo de administración. Consulte con su médico o farmacéutico si tiene dudas.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Se recomienda tomar este medicamento preferentemente con las comidas.

Si olvida tomar una dosis, tómela tan pronto como se acuerde, salvo que quede poco tiempo para la próxima administración, en ese caso ignore la dosis olvidada y siga con la pauta recomendada. No tome una dosis doble para compensar la dosis olvidada.

SOBREDOSIS:

Si usted ha tomado más cantidad del medicamento de la que debe, consulte a su médico o farmacéutico.

En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono: 91 562 04 20.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

Consulte con su médico si usted o su hija está embarazada o en período de lactancia antes de tomar este medicamento. No se recomienda el uso de tiamina durante el embarazo ni en mujeres en edad fértil que no estén utilizando métodos anticonceptivos.

La tiamina se excreta en la leche materna. La información sobre los efectos de este medicamento en recién nacidos y bebés es insuficiente por lo que no debería utilizarse durante la lactancia.

USO EN NIÑO:

Ver apartado indicaciones y posología.

EFFECTO SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:

No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener cuidado al realizar estas tareas hasta que conozca cómo tolera el tratamiento

OTRAS:

No se han descrito otras precauciones especiales. Advertencia: los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES:

Usted o su hijo/hija no debe tomar tiamina clorhidrato solución oral si: es alérgico/a o hay hipersensibilidad a tiamina o a cualquiera de los excipientes incluidos en la formulación (ver composición).

INTERACCIONES:

Comuníque a su médico o farmacéutico si usted o su hijo/a está tomando, o ha tomado recientemente o podría tomar cualquier otro medicamento incluso los adquiridos sin receta médica o plantas medicinales. Algunos de los fármacos a tener en cuenta son:

- Alcohol: puede disminuir la absorción de tiamina. Dosis más elevadas de tiamina pueden ser necesarias en pacientes con antecedentes de abuso de alcohol.
- Bloqueantes neuromusculares: la tiamina podría potenciar sus efectos.
- 5-FU (5-Fluorouracilo): inhibe el efecto de la tiamina.

Tenga en cuenta que las dietas ricas en carbohidratos pueden aumentar los requerimientos de tiamina.

REACCIONES ADVERSAS:

Por vía oral la aparición de reacciones adversas es excepcional. Si se observa cualquier otra reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

CONSERVACION:

Conservar en nevera (2°C-8°C), protegido de la luz y de la humedad. Mantener el envase bien cerrado. Una vez abierto el envase, desechar a los 30 días.

PLAZO DE VALIDEZ:

60 días