

Antibióticos por vía inhalada

6-11- 2013

Hola a todos:

Desde el servicio de trasplante pulmonar de mi hospital nos solicitan información acerca del uso de claritromicina, cefoxitina o linezolid por VÍA INHALADA para el tratamiento de una paciente de fibrosis quística con infección por *M. abscessus* sensible sólo a estos antibióticos.

¿Tenéis experiencia o información del uso de estos antibióticos vía inhalada en vuestros hospitales?

Un saludo y muchas gracias por vuestra ayuda

Mensaje enviado por: Servicio de Farmacia Hospital Universitario Puerta de Hierro.

Respuesta

Hola, por si te pudiera servir, en el 2010 se publicaron unas guías de consenso sobre el uso de antibióticos inhalados basado en la evidencia:

Le J, Ashley ED, Neuhauser MM, Brown J, Gentry C, Klepser ME, Marr AM, Schiller D, Schwiesow JN, Tice S, VandenBussche HL, Wood GC; Society of Infectious Diseases Pharmacists Aerosolized Antimicrobials Task Force. Pharmacotherapy 2010 Jun;30(6):562-84.

Saludos.

[consulta revision: 26-03-2014]

Respuesta enviada por: Grupo Trabajo Farmacotecnia SEFH