

ACETILCISTEINA 10% + UREA 5% CREMA O/A

FORMA FARMACÉUTICA:

Emulsiones

CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN

100 g

COMPOSICIÓN:

ACETILCISTEINA	10g
UREA	5g
GLICEROL	5g
SODIO, HIDRÓXIDO DE	2g
NEO PCL AUTOEMULSIONABLE	O/W 25g
ESENCIA DE ROMERO	1.5ml
AGUA PURIFICADA c.s.p.	100g

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Uso cutáneo

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:

INDICACIONES

Tratamiento tópico de la Ictiosis e Ictiosis lamelar.

POSOLOGÍA

Aplicar una o dos veces al día sobre la zona a tratar. Generalmente se inicia el tratamiento con un aplicación dos veces al día, una de ellas después del baño. Posteriormente y según respuesta puede aplicarse una vez al día después del baño como mantenimiento.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

En la Ictiosis lamelar se recomienda realizar un baño con agua caliente de 15 a 20 minutos, con el objetivo de retirar todas las escamas de la piel mediante arrastre. Aplicar la crema sobre la piel una vez limpia y seca.

SOBREDOSIS:

Si usted se ha aplicado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

Se recomienda la administración de acetilcisteína bajo supervisión médica durante embarazo y lactancia.

USO EN NIÑO:

Este tratamiento se ha empleado en niños mayores de 1 año, aunque en un número muy

reducido de pacientes.

EFFECTO SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:

No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener cuidado al realizar estas tareas hasta que conozca como tolera el tratamiento

OTRAS:

La presencia de olor sulfúreo no indica alteración del preparado, sino que es característica del principio activo acetilcisteína.

No se han descrito otras precauciones especiales. Advertencia: los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES:

Está contraindicado en caso de alergia y/o intolerancia a alguno de los componentes de la fórmula.

PRECAUCIONES:

No aplicar en las zonas con heridas o grietas ya que puede producir irritación y o prurito. Si se aprecia un cambio en el estado físico y apariencia de la fórmula, deseche el envase y comuníquelo al farmacéutico.

INTERACCIONES:

Metales, caucho, sustancias oxidantes y algunos antibióticos por vía tópica (lactobionato de eritromicina, anfotericina, y ciertas tetraciclinas).

REACCIONES ADVERSAS:

Ocasionalmente puede provocar irritación local, sensación de quemazón y prurito moderados.

CONSERVACION:

Mantener el envase bien cerrado, protegido de la luz y la humedad y a temperatura inferior a 30° C.

Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ:

Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 30 días desde su elaboración. No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:

28/03/2017