

## ACIDO ACETICO 5% SOLUCIÓN TOPICA

### FORMA FARMACÉUTICA:

Soluciones

### CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN

100 ml

### COMPOSICIÓN:

|                        |       |
|------------------------|-------|
| ACÉTICO GLACIAL, ÁCIDO | 5ml   |
| AGUA PURIFICADA c.s.p. | 100ml |

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Uso cutáneo

### INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:

#### INDICACIONES

- La dilución al 5% es bactericida (pH menor de 3). A concentraciones menores (pH 3-6) la dilución es bacteriostática.
- Soluciones del 1-5% se utilizan como antibacterianas frente a *Pseudomonas* spp, *Haemophilus* spp, algunos hongos (*Candida* spp) y protozoos (*Tricomonas* spp).
- Al 5% se utiliza para el diagnóstico de carcinoma de vulva. Esta solución para ser efectiva debe ser aplicada frecuentemente sobre el epitelio queratinizado. La reacción de color blanco al ácido acético permite el diagnóstico de lesiones específicas que de otro modo no se identificarían.

#### POSOLOGÍA:

Soluciones tópicas como antibacterianas se suelen utilizar en forma de fomentos, aplicando sobre el área a tratar durante 15-30 min varias veces al día, según prescripción médica. Algunas indicaciones requieren la aplicación del producto por personal especializado.

### NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Algunas indicaciones requieren la aplicación del producto por personal especializado.

### SOBREDOSIS:

Si usted se ha aplicado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20.

### EMBARAZO Y LACTANCIA:

Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

### USO EN NIÑO:

No existe experiencia sobre el uso de este medicamento en niños.

**EFFECTO SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:**

No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener cuidado al realizar estas tareas hasta que conozca cómo tolera el tratamiento.

**OTRAS:**

Recomendable protección ocular para su manipulación. Advertencia: los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

**CONTRAINDICACIONES:**

Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formulación.

**PRECAUCIONES:**

Se debe manejar con cuidado porque es irritante.

**INTERACCIONES:**

Este medicamento puede interaccionar con otros. Consulte a su médico ó farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento, sobre todo los adquiridos sin receta o productos de herbolario.

**REACCIONES ADVERSAS:**

La aplicación local o tópica puede producir escozor o prurito.

**CONSERVACION:**

Conservar a temperatura inferior a 25°C, protegido de la luz y la humedad.

Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

**PLAZO DE VALIDEZ:**

Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 3 meses desde su elaboración.

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

**FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:**

09/09/2017