

ACIDO TRICLOROACETICO SOLUCIÓN TOPICA

FORMA FARMACÉUTICA:

Soluciones

CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN

100 ml

COMPOSICIÓN:

TRICLOROACÉTICO ÁCIDO	20g
AGUA PURIFICADA c.s.p.	100ml

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Uso cutáneo

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:

INDICACIONES

- Cáustico usado en tratamiento de verrugas, condilomas, cicatrices viriliformes y peelins en piel acneica y gruesa.
 - Se utiliza en distintas concentraciones entre el 10-90%. Para el tratamiento del condiloma se suele utilizar en concentraciones entre el 80-90%
- Utilizar según prescripción médica. Algunas indicaciones requieren la aplicación del producto por personal especializado.

POSOLOGÍA:

Aplicar la solución sobre la verruga una vez cada dos o tres días. Antes de su administración proteger los tejidos que rodean la verruga a tratar con vaselina filante. El ácido tricloroacético induce una coloración blanquecina en la verruga tras su aplicación y el paciente siente el dolor intenso de la quemadura.

En el caso de cicatrices aplicar mediante toques en la piel normal del borde de la cicatriz a fin de nivelar las aristas de la misma. En el tratamiento de escaras faciales superficiales y acné, aplicar mediante torunda de algodón fijada a una varilla aplicadora, limpiando con agua tan pronto como empiece a aparecer blanqueado.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Antes de su administración proteger los tejidos que rodean la zona a tratar con vaselina filante. Evitar el contacto con el producto durante la administración, recomendable el uso de guantes durante la misma.

SOBREDOSIS:

Si usted se ha aplicado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

USO EN NIÑO:

No existe experiencia sobre el uso de este medicamento en niños.

EFEECTO SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:

No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener cuidado al realizar estas tareas hasta que conozca cómo tolera el tratamiento.

OTRAS:

Es muy cáustico y tóxico por inhalación, por lo que debe manejarse con protección ocular, mascarilla FFP3 entre otras medidas de precaución. Advertencia: los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formulación.

PRECAUCIONES:

Se debe manejar con cuidado porque es irritante y posible carcinogénico en humanos.

INTERACCIONES:

Este medicamento puede interactuar con otros. Consulte a su médico ó farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento, sobre todo los adquiridos sin receta o productos de herbolario.

REACCIONES ADVERSAS:

La aplicación local o tópica puede producir escozor o prurito.

CONSERVACION:

Conservar a temperatura inferior a 25°C, protegido de la luz y la humedad.

Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ:

Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 3 meses desde su elaboración.

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:

09/09/2017