

ÁCIDO FÓLICO 0,05 mg/ml solución oral

FORMA FARMACÉUTICA:

Solución

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral

INDICACIONES Y POSOLOGÍA:

Prevención y tratamiento de estados carenciales de ácido fólico: Anemias megaloblásticas, en la infancia, embarazo, síndrome de malabsorción. Profilaxis de defectos en el tubo neural (espina bífida, anencefalia, encefalocele) en mujeres con antecedentes de hijo o feto con deficiencias en el tubo neural.

Posología: Prematuros: 15mcg/kg/día. Niños: 1año-11años: dosis de carga (1mg/día) seguido de dosis de mantenimiento (0,1-0,4mg/día). Niños: >11 años: dosis inicial (1 mg/día) seguido de 0,5mg/día de mantenimiento.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Puede ser administrado con alimentos

SOBREDOSIS:

En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información toxicológica, tfno: 915620420.

EMBARAZO:

Considerado seguro en embarazadas.

LACTANCIA:

Compatible con la lactancia.

USO EN NIÑOS: Aceptado su uso en pediatría.

EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:

No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener cuidado al realizar estas tareas hasta que conozca cómo tolera el tratamiento.

OTRAS ADVERTENCIAS:

Advertencias sobre los excipientes:

PARAHIDROXIBENZOATO DE METILO Y PROPILO: Puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas)

PROPILENGLICOL: Puede producir síntomas parecidos a los del alcohol, por lo que puede disminuir la capacidad para conducir o manejar maquinaria.

CONTRAINDICACIONES:

No tome este medicamento si tiene alergia al principio activo (ácido fólico) o a

cualquiera de sus excipientes.

PRECAUCIONES:

Se debe tener especial cuidado en caso de anemia de origen desconocido.

INTERACCIONES:

Puede interactuar con antagonistas del ácido fólico (metotrexato, sulfonamidas, trimetoprim, pirimetamina, aminopterina), antiepilépticos, suplementos de zinc, antiácidos, colestiramina, colestipol, triamtereno, antimaláricos, anticonceptivos orales, sulfasalacina, antituberculosos, corticosteroides (uso prolongado) y alcohol.

REACCIONES ADVERSAS:

Reacciones de hipersensibilidad (alergia), tales como eritema de la piel, prurito, y en casos más graves dificultad respiratoria asociada a broncoespasmo. Alteraciones gastrointestinales, como diarrea, náuseas y/o vómitos.

CONSERVACIÓN:

Entre 2-8 °C y protegido de la luz. Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ:

Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 1 mes desde su elaboración. No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:

Marzo 2014.