

ÁCIDO FOLÍNICO 5 mg/ml suspensión oral

FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensiones.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía oral

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:

Está indicado en la prevención y tratamiento de los efectos adversos derivados de la administración de fármacos antagonistas del ácido fólico. Se utiliza también en el tratamiento de la anemia megaloblástica por deficiencia en folatos.

Posología: Siga estrictamente la pauta indicada por el médico en cuanto a la dosis y las horas de administración.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

No interfiere con la toma de alimentos. Se recomienda ingerir con alimentos. Si está en tratamiento con colestiramina o medicamentos similares, tome el ácido folínico 1 hora antes o 4 horas después.

SOBREDOSIS:

Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

Embarazo: Aceptado su uso en el embarazo.

Lactancia: Aceptado su uso en la lactancia. Categoría A de la FDA, (Categoría C a dosis altas)

USO EN NIÑOS:

Uso aceptado en niños Los requerimientos de ácido fólico varían con la edad. Aténgase a la dosis prescrita por su médico

EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:

Hasta el momento no se han descrito los posibles efectos de este medicamento sobre la conducción.

OTRAS PRECAUCIONES:

Este medicamento contiene ALMIDÓN DE MAIZ. Este medicamento contiene LACTOSA y SACAROSA. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

CONTRAINDICACIONES:

El folinato cálcico no debe administrarse como agente único en el tratamiento de la ANEMIA POR DEFICIT DE VITAMINA B-12 u otra ANEMIA POR DEFICIT DE VITAMINA B-12 megaloblástica, debido a que puede enmascarar la anemia pues aunque origina remisión hematológica, no impide la remisión de las manifestaciones neurológicas.

No tome este medicamento si tiene alergia al ácido folínico o a cualquiera de sus excipientes.

PRECAUCIONES:

El folinato cálcico puede disminuir el efecto de los fármacos antiepilépticos (fenobarbital, primidona, fenitoína y succinimidas), y puede aumentar la frecuencia de convulsiones en pacientes epilépticos debido a disminución de los niveles plasmáticos de ciertos antiepilépticos. Consulte con su médico si está en tratamiento con alguno de estos medicamentos.

INTERACCIONES:

Indique a su médico o farmacéutico si está en tratamiento con fenitoína, sulfasalazina o trimetoprim/sulfametoxazol. Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando algún otro medicamento, incluso si no necesita receta o es un producto de herbolario.

REACCIONES ADVERSAS:

Es un medicamento seguro. Puede producir en ocasiones reacciones alérgicas, y en algunos casos diarrea, alteraciones cutáneas, conjuntivitis y lagrimeo. Es raro y muy poco frecuente pero se han descrito casos de ataques epilépticos, irritación e insomnio.

CONSERVACIÓN:

Entre 2-8 °C y protegido de la luz.

Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ:

Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 1 mes desde su elaboración. No utilizar después del plazo de validez o fecha de caducidad indicada en el envase.

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:

Abril 2014