

AGUA CONSERVANTE

FORMA FARMACÉUTICA:

Soluciones

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía oral

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:

Vehículo para preparar otras fórmulas

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

No hay normas concretas para la administración de esta fórmula

SOBREDOSIS:

Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

USO EN NIÑO:

Aceptado su uso en niños

EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:

Hasta el momento no se han descrito los posibles efectos de este medicamento sobre la conducción

OTRAS:

Puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardas) porque contiene parahidroxibenzoato de propilo y parahidroxibenzoato de metilo.

Los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES:

No utilice este medicamento si tiene alergia a alguno de los componentes de la fórmula.

PRECAUCIONES:

No procede

INTERACCIONES:

Si se emplean las sales sódicas de los parabenos se puede afectar al pH, resultando más alcalino y afectando a determinadas fórmulas como por ejemplo los jarabes de morfina.

REACCIONES ADVERSAS:

No procede

CONSERVACIÓN:

Se debe mantener bien cerrado y a temperatura inferior a 30 °C.

PLAZO DE VALIDEZ:

Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 6 meses desde su elaboración. No utilizar después del plazo de validez o fecha de caducidad indicada en el envase.

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:

23/04/2014