

5-FLUOROURACILO 5% pasta

FORMA FARMACÉUTICA:

Pasta

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica

INDICACIONES Y POSOLOGÍA:

Por vía tópica en el tratamiento de lesiones cutáneas malignas y premalignas. En afecciones de la piel producidas por Papovavirus (verrugas y papilomas) especialmente para verrugas próximas a las uñas (periungueles). Posología: Dos aplicaciones al día sobre las áreas afectadas durante 10-12 días.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Antes de su aplicación, lavar la zona con agua y jabón y secar bien. Se aplica con una gasa o un algodón, utilizando guantes o un aplicador no metálico. Tras una o dos semanas, la piel enrojece y se pelará : esto es un efecto normal del tratamiento. Evite la exposición al sol o lámparas UV.

SOBREDOSIS:

En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información toxicológica, tño: 915620420.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento

USO EN NIÑOS:

No existe experiencia sobre el uso de este medicamento en niños.

EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:

Hasta el momento no se han descrito los posibles efectos de este medicamento sobre la capacidad de conducción.

OTRAS ADVERTENCIAS:

Si la pomada entra en contacto con los ojos, nariz, boca o si se ensucia las manos, debe lavarse inmediatamente.

CONTRAINDICACIONES:

No tome este medicamento si tiene alergia al principio activo de este medicamento (5-Fluorouracilo) o a cualquiera de sus excipientes.

PRECAUCIONES:

No debe administrarse sobre las membranas mucosas. Existe una posibilidad de aumento de la absorción si se emplea sobre piel ulcerada o inflamada. Debe evitarse la exposición al sol.

INTERACCIONES:

Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando algún otro medicamento, incluso si no necesita receta o es un producto de herbolario.

REACCIONES ADVERSAS:

Después del uso tópico han aparecido reacciones inflamatorias locales y de fotosensibilidad. Se han descrito dermatitis y eritema multiforme en ocasiones. La parte sana de la piel puede enrojecer. A dosis elevadas puede producir reacciones granulomatosas.

CONSERVACIÓN:

Conservar a temperatura ambiente. Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ:

Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 2 meses desde su elaboración. No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:

Julio 2014.