

FUROSEMIDA 2 MG/ML SOLUCIÓN ORAL

FORMA FARMACÉUTICA:

Soluciones

CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN

100 ml

COMPOSICIÓN:

FUROSEMIDA	0.2g
FOSFATO DISÓDICO (12H ₂ O)	1.5g
AGUA CONSERVANTE SIN	
PROPILENGLICOL c.s.p.	100ml

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía oral

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:

Furosemida es un medicamento que pertenece a un grupo llamado “diuréticos del asa”. Actúa fundamentalmente aumentando la eliminación de orina (diurético). Se utiliza en el tratamiento de edemas (hinchazón por acumulación de líquidos) de origen cardiaco, hepático o renal, así como en edemas producidos después de quemaduras.

La dosificación debe ser individualizada en función de la edad y el peso por lo que su médico establecerá la dosis adecuada para usted o su hijo/a y realizará los ajustes que considere oportunos. Siga estrictamente la pauta indicada por su médico en cuanto a las dosis y al intervalo de administración. Consulte con su médico o farmacéutico si tiene dudas.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Los alimentos pueden afectar la absorción de la furosemida. Por tanto, se recomienda administrar separado de la toma de alimentos (por ejemplo, 1 hora antes de las comidas o 2 horas después), siempre que sea posible.

Si olvida administrar o tomar una dosis, tómela tan pronto como se acuerde, salvo que quede poco tiempo para la próxima administración, en ese caso ignore la dosis olvidada y siga con la pauta recomendada.

SOBREDOSIS:

Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico o farmacéutico.

En caso de sobredosis, el síntoma más probable es una sensación de mareo debido a un descenso repentino o excesivo de la tensión arterial. En caso de intoxicación o sobredosis el paciente debe acudir inmediatamente a un centro médico o llamar al Servicio de Información Toxicológica, teléfono: 91 562 04 20.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

No se recomienda tomar este medicamento durante el embarazo ni en el periodo de lactancia, a menos que su médico sí se lo haya indicado.

USO EN NIÑO:

Ver apartado de indicaciones y posología

EFFECTO SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:

Al ser la furosemida un fármaco que modifica la tensión arterial, no se debe conducir vehículos ni manejar máquinas si aparecen mareos o síntomas relacionados. Este hecho es especialmente importante al comienzo del tratamiento, cuando se aumente la dosis, se cambie el tratamiento o cuando se ingiera alcohol de forma concomitante.

OTRAS:

Este medicamento debe mantenerse fuera del alcance y de la vista de los niños

CONTRAINDICACIONES:

- Pacientes con hipersensibilidad a furosemida. Los pacientes alérgicos a sulfonamidas (p. ej. Sulfonilureas o antibióticos del grupo de las sulfonamidas) pueden mostrar sensibilidad cruzada a furosemida.
- Pacientes con hipovolemia o deshidratación.
- Pacientes con insuficiencia renal anúrica que no responda a furosemida.
- Pacientes con hipopotasemia o hiponatremia grave.
- Pacientes en estado precomatoso y comatoso asociado a encefalopatía hepática.
- Lactancia.

PRECAUCIONES:

Tenga especial cuidado con este medicamento si presenta un volumen de orina reducido (oliguria), su presión arterial es baja (hipotensión), padece diabetes, tiene problemas graves de riñones y/o hígado, o padece lupus eritematoso sistémico.

Durante el tratamiento se requiere un control periódico de los niveles de electrolitos (sodio, potasio y cloro principalmente) en sangre.

Se recomienda el uso de cremas de protección solar así como evitar la exposición solar prolongada.

Este medicamento puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) debido a los excipientes parahidroxibenzoato de metilo y de propilo, contenidos en el agua conservante sin propilenglicol.

INTERACCIONES:

Furosemida puede interaccionar con numerosos medicamentos entre los que se encuentran hidrato de cloral, antibióticos aminoglucósidos (por ejemplo, gentamicina), antidiabéticos, digoxina, antiinflamatorios no esteroideos (por ejemplo, ibuprofeno), sucralfato, algunas cefalosporinas (por ejemplo, cefalotina y cefaloridina), ciclosporina A, cisplatino, metotrexato, levotiroxina, litio, así como otros medicamentos antihipertensivos y diuréticos.

REACCIONES ADVERSAS:

Furosemida puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Los efectos adversos que se han observado más frecuentemente son la disminución de los niveles de sodio, potasio y cloro en sangre (hiponatremia, hipopotasemia, hipocloremia), deshidratación y descenso del volumen total de sangre (hipovolemia). Estas alteraciones se pueden manifestar como sed intensa, dolor de cabeza, confusión, calambres musculares, debilidad muscular etc. Otras reacciones adversas que pueden ocurrir son ruidos en el oído y/o disminución de la audición, aumento de los niveles de glucosa en sangre (de especial relevancia en pacientes diabéticos) así como de los niveles de calcio en orina que puede dar lugar a la formación de cálculos renales.

CONSERVACION:

Conservar a temperatura ambiente (no >25°C) y protegido de la luz. Mantener el envase bien cerrado.

PLAZO DE VALIDEZ:

3 meses sin abrir. Una vez abierto, no utilizar después de 1 mes desde la fecha de su apertura.

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:

28/01/2021