

LEVAMISOL 25mg/ml SOLUCIÓN ORAL

FORMA FARMACÉUTICA:

Soluciones

CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN

100 ml

COMPOSICIÓN:

| | |
|-----------------------|--------|
| LEVAMISOL | 2500mg |
| AGUA CONSERVANTE SIN | |
| PROPILENGLICOL c.s.p. | 100ml |

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía oral

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:

INDICACIONES

- Síndrome nefrótico
- Antihelmíntico

POSOLOGÍA:

- Síndrome nefrótico en niños: 2,5mg/kg una vez al día administrado a días alternos (dosis máxima por día 150mg).
- Antihelmíntico: 2,5mg/kg (dosis máxima 150mg) una sola dosis, que puede ser repetida si es necesario a los 7 días.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Para mejorar la tolerancia vía oral, la dosis puede administrarse con comida o con leche.

SOBREDOSIS:

Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento. Es preferible no administrar este medicamento durante el embarazo.

USO EN NIÑO:

Ver indicaciones y posología.

EFECTO SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:

No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar

maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener cuidado al realizar estas tareas hasta que conozca cómo tolera el tratamiento.

OTRAS:

No se han descrito otras precauciones especiales. Advertencia: los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

CONTRAINDICACIONES:

- Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la formulación.
- Enfermedades hematológicas.

PRECAUCIONES:

- Epilepsia, artritis juvenil idiopática, síndrome de Sjögren, embarazo.
- Puede producir reacciones alérgicas (posiblemente retardadas) porque contiene parahidroxibenzoato de metilo y parahidroxibenzoato de propilo.

INTERACCIONES:

Anticoagulantes orales, alcohol, fármacos depresores de la médula ósea.

REACCIONES ADVERSAS:

Diarrea, discinesias, dolor de cabeza, vómitos. En tratamientos prolongados, artralgia, trastornos sanguíneos, insomnio, mialgia, rash cutáneo, disgeusia, vasculitis.

CONSERVACION:

Conservar refrigerado (2-8°C) protegido de la luz y la humedad.

Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ:

Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 30 días desde su elaboración. No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:

20/07/2017