

METADONA HIDROCLORURO 10 MG/ML SOLUCIÓN ORAL

FORMA FARMACÉUTICA:

Soluciones

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía oral

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:

La metadona es un opiáceo que tiene, entre otras acciones la analgésica. Reduce los síntomas de abstinencia en pacientes dependientes de opiáceos. Se utiliza principalmente en la deshabituación de drogas opiáceas (opio, morfina, heroína etc.), en el tratamiento del síndrome de abstinencia y como sustituto de las drogas en personas dependientes de opiáceos. También se utiliza para tratar el dolor intenso.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Para facilitar la administración de la solución se recomienda diluir la cantidad requerida del mismo en zumo de frutas cítricas o sucedáneo.

SOBREDOSIS:

Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

En el embarazo y la lactancia es especialmente importante seguir las instrucciones del médico

USO EN NIÑO:

En los niños es especialmente importante seguir las instrucciones del médico

EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:

La capacidad para conducir vehículos o utilizar maquinaria puede verse negativamente afectada.

OTRAS:

Contiene una sustancia susceptible de producir resultado positivo en un control de dopaje.

CONTRAINDICACIONES:

Está contraindicada en caso de alergia a metadona, pacientes con enfermedad respiratoria grave, lesiones cerebrales (incluida epilepsia), dolor abdominal agudo de etiología desconocida, hipertrofia prostática y estenosis uretral.

PRECAUCIONES:

Los pacientes con asma crónico, hipotensión e hipotiroidismo deben estar rigurosamente controlados por el médico y seguir fielmente sus instrucciones.

INTERACCIONES:

Interacciona con alcohol, medicamentos tranquilizantes y otros medicamentos o drogas opiáceas, porque disminuyen aún más las funciones vitales y puede producirse la muerte. También interacciona con ciertos antidepresivos, inductores enzimáticos (rifampicina, carbamazepina, efavirenz, fenobarbital y fenitoína) e inhibidores enzimáticos (ritonavir, indinavir, ketoconazol, itraconazol, cimetidina, ciclosporina, etc.).

REACCIONES ADVERSAS:

Las más frecuentes son: náuseas, vómitos, estreñimiento, sudoración, euforia, aturdimiento, mareo, sedación y depresión respiratoria. Con tratamientos prolongados se desarrolla tolerancia y dependencia.

CONSERVACIÓN:

Se debe conservar en nevera.

PLAZO DE VALIDEZ:

Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 1 mes desde su elaboración. No utilizar después del plazo de validez o fecha de caducidad indicado en el envase.

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:

Junio de 2014