

## PROPRANOLOL 1 mg/mL SOLUCIÓN ORAL

### FORMA FARMACÉUTICA:

Soluciones

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía oral

### INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:

Su médico se lo ha pautado para controlar su tensión arterial, alteraciones en el ritmo del corazón u otras alteraciones cardíacas (angina de pecho, cardiopatía isquémica, etc).

Posología:

- Arritmias:
  - o Neonatos: 0.25-0.5 mg/kg c/8 h
  - o Lactantes y niños: 0.25-0.5 mg/kg c/6/8 h ajustar a respuesta máxima 160 mg/día
- Hipertensión:
  - o Neonatos: inicial 0.25mg/kg/c/8h (max 2 mg/kg/día)
  - o Lactantes y niños: 0.25-1 mg/kg c/8h (max 5 mg/kg/día)
  - o Adolescentes: inicial 80 mg c/12 h (max 160-320 mg/día)

Siga estrictamente la pauta indicada por su médico en cuanto a la dosis y las horas de administración

### NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Tómelo con comidas, intentando que sea siempre del mismo modo (el mismo régimen de comidas) e intente tomarlo siempre a la misma hora.

Puede mezclarse con agua o zumos para mejorar el sabor.

Si toma antiácidos separar 2 horas su administración.

Se recomienda no variar los hábitos de la administración.

### EMBARAZO Y LACTANCIA:

Si el paciente se encuentra en edad fértil evitar el embarazo y la lactancia mientras esté tomando este medicamento.

### USO EN NIÑOS:

Aceptado su uso en niños

### EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:

Tenga precaución en actividades que requieran precisión, concentración y al levantarse bruscamente. Este medicamento puede producir mareos.

### OTRAS:

Este medicamento contiene sacarosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

### CONTRAINDICACIONES:

No tome este medicamento si tiene alergia a propranolol, al grupo de medicamentos beta-bloqueantes o a cualquiera de los excipientes de la fórmula.

#### **PRECAUCIONES:**

Avise a su médico si tiene alguna enfermedad en el riñón, en el hígado, en el tiroides, diabetes, asma u otros problemas respiratorios, problemas de circulación e historial de reacciones alérgicas severas (estos pacientes pueden no responder a dosis habituales de adrenalina).

Si es diabético controle más estrechamente sus niveles de glucosa en sangre, este medicamento puede enmascarar los síntomas de hipoglucemia.

Este medicamento contiene sacarosa (867 mg/ml) lo que deberá ser tenido en cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a azúcares y pacientes diabéticos.

#### **INTERACCIONES:**

Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando algún otro medicamento, incluso si no necesita receta o es un producto de herbolario.

#### **REACCIONES ADVERSAS:**

Puede padecer fatiga, trastornos del sueño, mareos. Si estas reacciones se vuelven severas consúlteselo a su médico. Avise a su médico inmediatamente si presenta dificultad para respirar, dolor en el pecho, mareo severo, irregularidades en el latido cardíaco, hemorragias, extremidades frías y hormigueo o reacción alérgica. Si aprecia cualquier efecto adverso que no hemos mencionado informe a su médico.

#### **CONSERVACIÓN:**

Conservar en nevera. Proteger de la luz Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

#### **PLAZO DE VALIDEZ:**

Esta fórmula magistral tiene un periodo de validez de 30 día desde su elaboración No tome el medicamento después de la fecha de caducidad que figura en el envase.

#### **FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:**

Abril de 2014