

## PERCLORATO POTÁSICO 500 MG CÁPSULAS DURAS

### FORMA FARMACÉUTICA:

Cápsulas gelatina

### CANTIDAD Y UNIDAD DEL LOTE PATRÓN

100 uds

### COMPOSICIÓN:

POTASIO PERCLORATO	50g
EXCIPIENTE N.1 PARA CÁPSULAS	c.s.p.68ml
RIBOFLAVINA	0.05g
CÁPSULAS Nº 0	100uds

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía oral

### INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:

#### INDICACIONES

Prueba de descarga de perclorato de la función tiroidea.

Reducción de la acumulación de pertecnetato en el plexo coroideo en la administración de pertecnetato - Tc 99m.

#### POSOLOGÍA

Seguir las indicaciones médicas. Generalmente una dosis única de 500mg.

### NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Administración oral. No hay normas concretas para la administración de este medicamento. Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas.

### SOBREDOSIS:

Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 91-562-04-20.

### EMBARAZO Y LACTANCIA:

Si está o puede estar embarazada o si está en periodo de lactancia, consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar este medicamento.

### USO EN NIÑO:

Ver indicaciones y posología.

### EFFECTO SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:

No es probable que pueda alterarse su habilidad para conducir vehículos o manejar maquinaria peligrosa. No obstante, al inicio del tratamiento debería tener cuidado al realizar

estas tareas hasta que conozca cómo tolera el tratamiento.

**OTRAS:**

No se han descrito otras precauciones especiales. Advertencia: los medicamentos deben mantenerse fuera del alcance de los niños.

**CONTRAINDICACIONES:**

No utilice este componente si tiene alergia al mismo.

**PRECAUCIONES:**

Reduce la captación y concentración de yodo, pertecnetato y otros aniones en la tiroides, el plexo coroideo, la mucosa gástrica y las glándulas salivales, probablemente mediante la inhibición competitiva de mecanismos de transporte activo.

**INTERACCIONES:**

Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando algún otro medicamento, incluso si no necesita receta o es un producto de herbolario.

**REACCIONES ADVERSAS:**

Raramente produce efectos secundarios con una sola dosis.

Se han descrito fiebre y exantemas tras su administración. Algunos pacientes pueden experimentar náuseas y vómitos.

Su administración prolongada puede producir anemia aplásica (algunas veces mortal), agranulocitosis, leucopenia, pancitopenia, y síndrome nefrótico.

Las dosis excesivas pueden causar hipotiroidismo y bocio.

**CONSERVACION:**

Conservar a temperatura inferior a 30°C, protegido de la luz y la humedad.

Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

**PLAZO DE VALIDEZ:**

Esta fórmula magistral tiene un plazo de validez de 6 meses desde su elaboración. No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

**FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:**

26/03/2017