

SULFADIAZINA 100 mg/mL SUSPENSIÓN ORAL

FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensiones

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Vía oral

INDICACIÓN Y POSOLOGÍA:

Toxoplasmosis congénita asociado a pirimetamina, profilaxis de fiebre reumática en pacientes alérgicos a penicilina, tratamiento de malaria, profilaxis de meningitis meningocócica y otros.

Posología:

Toxoplasmosis congénita: 100 mg/kg/día cada 12 horas, durante 12 meses, asociado a primetamina

Toxoplasmosis: 120-200 mg/kg/día cada 6 horas, asociado a primetamina.

Profilaxis de fiebre reumática: ≤ 30 kg: 500 mg/24 horas y > 30 kg: 1 g/24 horas.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Administrar preferentemente en ayunas, junto con un vaso de agua.

Agite bien el envase antes de administrar el medicamento.

Si olvida tomar una dosis tómela tan pronto como se acuerde, salvo que quede poco tiempo para la próxima administración, en ese caso ignore la dosis olvidada. Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras distintas.

SOBREDOSIS:

Si usted ha tomado más cantidad de medicamento de la que debe, consulte a su médico o farmacéutico. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consulte al Servicio de Información Toxicológica, teléfono 915620420.

EMBARAZO Y LACTANCIA:

Considerado generalmente como seguro durante los 2 primeros trimestres del embarazo, aunque contraindicado en el tercer trimestre de gestación. Uso controvertido durante la lactancia materna.

USO EN NIÑOS:

Contraindicado en niños menores de 2 años, excepto en toxoplasmosis congénita.

EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:

Hasta el momento no se han descrito los posibles efectos de este medicamento sobre la conducción.

OTRAS ADVERTENCIAS:

Debe evitarse la exposición prolongada al sol. Debe observarse cualquier alteración cutánea (palidez, dermatitis) pues puede ser indicativo de reacciones adversas graves.

Este medicamento contiene lactosa, sacarosa y sorbitol. Si su médico le ha indicado que tiene una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento. Este medicamento puede producir dolor de cabeza, molestias de estómago y diarrea porque contiene glicerol.

CONTRAINDICACIONES:

No tome este medicamento si tiene alergia a sulfadiazina, al grupo de medicamentos sulfamidas o a cualquiera de los excipientes de la fórmula.

No tome este medicamento si se encuentra en su tercer trimestre de embarazo. Este medicamento está contraindicado en niños menores de 2 años excepto en el caso de toxoplasmosis congénita.

PRECAUCIONES:

Asma, diabetes, insuficiencia renal o hepática (requiere ajuste de dosis) y obstrucción urinaria. Reacciones de fotosensibilidad.

INTERACCIONES:

Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando algún otro medicamento, incluso si no necesita receta o es un producto de herbolario.

REACCIONES ADVERSAS:

Afectan mayoritariamente al aparato digestivo (nauseas, vómitos), sistema nervioso y sistema hematopoyético (alteraciones sanguíneas). Más raramente puede producir confusión, agitación, depresión, insomnio o alteraciones del equilibrio.

CONSERVACIÓN:

Conservar en nevera. Mantener este medicamento fuera del alcance y de la vista de los niños.

PLAZO DE VALIDEZ:

Esta fórmula magistral tiene un periodo de validez de 1 mes desde su elaboración No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase

FECHA ÚLTIMA REVISIÓN:

Abril de 2014