

¿Qué es AXITINIB?

Es un antineoplásico (inhibidor de tirosina quinasa) que impide la diseminación de células tumorales, utilizado en el tratamiento del **cáncer renal**.



¿Qué dosis debo tomar?

Debe tomar un comprimido dos veces al día:

Excipientes: lactosa

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

¿Cómo debería tomar AXITINIB?

Deberá tomar la dosis indicada **con o sin alimentos dos veces al día** (Evite tomar antiácidos dos horas antes y después de la administración de axitinib). No fraccione ni mastique los comprimidos.

¿Qué hago si olvido una dosis?

NO tome la dosis olvidada, y continúe su tratamiento con normalidad.
En caso de vómito, **NO tome otra dosis**, y continúe su tratamiento con normalidad.

¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a Axitinib o alguno de sus excipientes.
- Historial de enfermedad hepática, cardíaca y/o alteraciones tiroideas.
- Antes de administrar vacunas por riesgo aumentado de infección.
- Embarazo y lactancia.

¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
 - Dolor de cabeza, falta de apetito, alteración del gusto, estreñimiento, diarrea, náuseas, reacciones cutáneas, dolor óseo/muscular, cansancio, dolor abdominal, tos, hemorragias, alteraciones dérmicas y aumento de la tensión arterial.
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
 - Alteraciones cardíacas y de la coagulación y fragilidad/perdida capilar.
- Graves:
 - Leucoencefalopatía posterior reversible, aparición de trombos y fallo renal.

Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la hoja “¿Qué hago si....?”

¿AXITINIB puede interaccionar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con Axitinib son:

Fenitoina, Carbamazepina, Rifampicina, Dilitazem, Valproico
Antiácidos, Teofilina
Zumo de Pomelo, Hierva de San Juan

¿Cómo debo conservar AXITINIB?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, del calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de tu Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja, la funda protectora y el estuche después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Observaciones:

Axitinib requiere una manipulación especial. Consulte la hoja “Manipulación de fármacos especiales