


## ¿Qué es COBIMETINIB?

Es un antineoplásico (inhibidor de tirosina quinasas) que impide el crecimiento de células tumorales, utilizado junto con Vemurafenib en el tratamiento del **melanoma** (cáncer de piel).



## ¿Qué dosis debo tomar?

Excipientes: lactosa

Debe tomar tres comprimidos una vez al día:

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

**Tres semanas seguidas + una semana de descanso**

## ¿Cómo debería tomar COBIMETINIB?

Deberá tomar la dosis indicada **con o sin alimentos una vez al día.**

No fraccione ni mastique los comprimidos.

## ¿Qué hago si olvido una dosis?

**Tómela si quedan más de 12 horas para la próxima dosis,** y continúe su tratamiento con normalidad.

**En caso de vómito,** no tome otra dosis ese día, y continúe su tratamiento con normalidad..

## ¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a cobimetinib o alguno de sus excipientes.
- Historial de enfermedad renal, hepática y/o cardíaca.
- Antes de administrar vacunas por riesgo aumentado de infección.
- Embarazo y lactancia.

## ¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
  - Fatiga, alteraciones visuales, hipertensión, diarrea, náuseas, vómitos, fotosensibilidad, reacciones dérmicas y hemorragia.
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
  - Alteraciones cardíacas.
- Graves
  - Carcinoma de células basales y escamosas.

Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la hoja “¿Qué hago si....?”

## ¿COBIMETINIB puede interaccionar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con cobimetinib son:

Conivaptan, Amiodarona, Claritromicina, Verapamilo, Imatinib
Valproico, Carbamazepina
Tratamientos para VIH
Antifúngicos: Itraconazol, Voriconazol, Posaconazol
Hierba de San Juan, Zumo de pomelo

## ¿Cómo debo conservar COBIMETINIB?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

## Observaciones:

Cobimetinib requiere una manipulación especial. Consulte la hoja “Manipulación de fármacos especiales”