

¿Qué es CRIZOTINIB?

Es un antineoplásico (inhibidor de tirosina quinasas) que impide el crecimiento de células tumorales, utilizado en el tratamiento del **cáncer de pulmón**.



¿Qué dosis debo tomar?

Excipientes: almidón de patata

Debe tomar un comprimido de 250mg dos veces al día:

Horario																							
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24					

¿Cómo debería tomar CRIZOTINIB?

Deberá tomar la dosis indicada **con o sin alimentos dos veces al día**.
No fraccione ni mastique las capsulas.

¿Qué hago si olvido una dosis?

Tómela si quedan más de seis horas para la próxima dosis, y continúe su tratamiento con normalidad.

En caso de vómito, NO tome otra dosis, y continúe su tratamiento con normalidad.

¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a Crizotinib o alguno de sus excipientes.
- Historial de enfermedad hepática, renal, cardiaca y alteraciones de la visión.
- Antes de administrar vacunas por riesgo aumentado de infección.
- Embarazo y lactancia.

¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
 - Mareos, falta de apetito, alteración de la visión, estreñimiento, diarrea, náuseas, vómitos, reacciones dérmicas (inflamación de pies y manos), retención de líquido, alteración del gusto, cansancio, dolor abdominal, arritmias y alteraciones hepáticas.
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
 - Alteraciones cardiacas, alteraciones gastrointestinales.
- Graves (1 de cada 1000 personas)
 - Fallo hepático y/o fallo renal.

Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la hoja “¿Qué hago si....?”

¿CRIZOTINIB puede interaccionar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con Crizotinib son:

Aprepitán, Domperidona, Ergotamina, Ciclosporina, Tacrolimus
Ketoconazol, Itraconazol, Voriconazol, Claritromicina, Telitromicina
Fentanilo, Budesonida, Tolvaptán, Ivabradina, Eplerenona, Ranolazina, Colchicina, Hidroxicina
Hierba de San Juan, Zumo de Pomelo

¿Cómo debo conservar CRIZOTINIB?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de tu Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja, la funda protectora y el estuche después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Observaciones:

Crizotinib requiere una manipulación especial. Consulte la hoja “Manipulación de fármacos especiales”