

¿Qué es DABRAFENIB?

Es un antineoplásico (inhibidor de tirosina quinazas) que impide el crecimiento de células tumorales, utilizado en el tratamiento del **melanoma** (cáncer de piel).



¿Qué dosis debo tomar?

Excipientes: propilenglicoll

Debe tomar una capsula dos veces al día:

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

¿Cómo debería tomar DABRAFENIB?

Deberá tomar la dosis indicada **sin alimentos (una hora antes, o dos horas después de las comidas) dos veces al día.**

No fraccione ni mastique las capsulas.

¿Qué hago si olvido una dosis?

Tómela si quedan más de seis horas para la próxima dosis, y continúe su tratamiento con normalidad..

En caso de vómito, NO tome otra dosis ese día, y continúe su tratamiento con normalidad.

¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a dabrafenib o alguno de sus excipientes.
- Historial de enfermedad renal, hepática, cardiaca, diabetes, deficiencia en la enzima Glucosa 6-P -DH.
- Antes de administrar vacunas por riesgo aumentado de infección.
- Embarazo y lactancia.

¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
 - Fiebre, dolor de cabeza, tos, diarrea, náuseas, vómitos, fatiga, dolor articular/muscular, cansancio, alteraciones electrolíticas y fragilidad/perdida capilar.
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
 - Reacciones dérmicas (síndrome mano-pie) y/o cardíacas.
- Graves (1 de cada 1000 personas)
 - Carcinoma cutáneo, insuficiencia renal, uveítis, y arritmias.

Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la hoja “¿Qué hago si....?”

¿DABRAFENIB puede interaccionar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con dabrafenib son:

Axatinib, Bosutinib, Cobimetinib, Conivaptan, Idelalisib, Ibrutinib
Dasabuvir, Deflazacor, Grazoprevir, Conivaptan, Ranolazina, Daclatasvir, Rifampicina
Ketoconazol, Claritromizina, Gemfibrozilo, Ritonavir, Atazanavir, Voriconazol, Fenitoína, Carbamazepina, Fenobarbital
Omeprazol, Lansoprazol, Pantoprazol.. etc... Anticonceptivos, Hierba de San Juan

¿Cómo debo conservar DABRAFENIB?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar las cápsulas en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Observaciones:

Dabrafenib requiere una manipulación especial. Consulte la hoja de “Manipulación de fármacos especiales”