

¿Qué es ENZALUTAMIDA?

Es un antiandrogénico que en hombres disminuye la testosterona (una hormona sexual) masculina, utilizado en el tratamiento del **cáncer próstata**.



¿Qué dosis debo tomar?

Debe tomar cuatro cápsulas una vez al día:

Excipientes: sorbitoll

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

¿Cómo debería tomar ENZALUTAMIDA?

Deberá tomar la dosis indicada **con o sin alimentos una vez al día**.
No fraccione ni mastique las capsulas.

¿Qué hago si olvido una dosis?

Tómela si quedan más de 12 horas para la próxima dosis, y continúe su tratamiento con normalidad.

En caso de vómito, NO tome otra dosis ese día, y continúe su tratamiento con normalidad.

¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a enzalutamida o alguno de sus excipientes (incluidos intolerantes a fructosa).
- Historial de enfermedad renal, hepática, cardiaca y convulsiones o epilepsia.
- Antes de administrar vacunas por riesgo aumentado de infección.

¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
 - o Dolor de cabeza, cansancio, aumento de la tensión arterial, diarrea, dolor muscular y sofocos.
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
 - o Ansiedad, alteración de la memoria, reacciones dérmicas, caídas y ginecomastia (aumento del pecho).
- Graves (menos de 1 de cada 1000 personas)
 - o Crisis epilépticas, encefalopatía posterior reversible, alteraciones cardíacas

Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la hoja “¿Qué hago si....?”

¿ENZALUTAMIDA puede interaccionar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos son:

Medicamentos para problemas cardíacos (Bisoprolol, Propanolol, Diltiazem, Digoxina, Warfarina, Acenocumarol, Apixaban, Ribaroxavan, Ticagrelor, Ranolazina, Nifedipino, Manodipino, Ivabradina, Candesartán, Felodipino, Nicardipino, Verapamilo, Dronedarona)
Medicamentos para la epilepsia, depresión o problemas psiquiátricos (Clozapina, Quetiapina, Carbamazepina, Clonazepam, Fenitoína, Ácido Valproico, Aripiprazol, Olanzapina, Risperidona, Litio, Clorpromazina, Amitriptilina, Imipramina, Mirtazapina, Zolpidem, Haloperidol, Hierba de San Juan)
Medicamentos para tratar infecciones (Claritromicina, Moxifloxacino, Doxiciclina, Indinavir, Ritonavir, Daclatasvir, Dasabuvir, Maraviroc)
Omeprazol, Mórnicos, Tramadol, Linagliptina, Montelukast, Corticoides, Gemfibrozilo, Levotiroxina, Colchicina, Ciclosporina, Tacrolimus, Tolvaptan, Apremilast, Aprepitant, Quinidina, Disopiramida, Amiodarona, Estatinas

¿Cómo debo conservar ENZALUTAMIDA?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar las cápsulas en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja, yo/ el estuche después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Observaciones:

Se debe mantener el tratamiento con un análogo de la LHRH durante el tratamiento en los pacientes no sometidos a castración quirúrgica.

Enzalutamida requiere una manipulación especial. Consulte la hoja “Manipulación de fármacos especiales”