

¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
 - Infecciones, disminución del apetito, alteraciones del gusto, heridas en la boca, dolor de cabeza, sangrado nasal, tos, diarrea, náuseas, reacciones dérmicas, cansancio y retención de líquido.
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
 - Insomnio, dolor óseo/muscular, aumento de tensión arterial, vómitos, sequedad de piel y mucosas (inflamación de mucosas), dolor bucal, fragilidad/perdida capilar, dolor abdominal, problemas al tragar, menstruación irregular y fiebre.
- Graves (menos de 1 de cada 1000 personas):
 - Angioedema, trombosis (embolismo pulmonar) y alteraciones cardiacas.

Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la hoja “¿Qué hago si....?”

¿EVEROLIMUS puede interaccionar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con Everolimus son:

IECA, antiarrítmicos, antiepilépticos, antibióticos, antifúngicos, fármacos contra VIH, hepatitis C, fármacos contra el cáncer

Natalizumab, Fingolimod, Leflunomida, Ciclosporina, Tacrolimus

Zumo de pomelo, Hierba de San Juan, Equinaceas

¿Cómo debo conservar EVEROLIMUS?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvela lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Observaciones:

Everolimus requiere una manipulación especial. Consulte la hoja “Manipulación de fármacos especiales