

¿Qué es IDELALISIB?

Es un antineoplásico (nhibe la fosfatidilinositol 3-quinasa) que impide el crecimiento de células tumorales, utilizado en el tratamiento de la **leucemia linfocítica crónica y el linfoma folicular.**



¿Qué dosis debo tomar?

Debe tomar una cápsula dos veces al día:

Excipientes: amarillo anaranjado
FCF

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

¿Cómo debería tomar IDELALISIB?

Deberá tomar la dosis indicada **con o sin alimentos dos veces al día.**

No fraccione ni mastique las capsulas.

¿Qué hago si olvido una dosis?

Tómela si quedan más de seis horas para la próxima dosis, y continúe su tratamiento con normalidad.

En caso de vómito, NO tome otra dosis, y continúe su tratamiento con normalidad..

¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a idelalisib o alguno de sus excipientes.
- Historial de enfermedad hepática y/o infecciones graves/cronicas.
- Antes de administrar vacunas por riesgo aumentado de infección.
- Embarazo y lactancia.

¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
 - Aumento de infecciones, diarrea, fiebre y reacciones dérmicas.
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
 - Neumonitis.
- Graves
 - Reacciones alérgicas y Síndrome de Stevens-Johnson.

Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la hoja “¿Qué hago si....?”

¿IDELALISIB puede interactuar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con idelalisib son:

Claritromicina, Telitromicina, Barnidipino, Lercanidipino, Nimodipino, Amlodipino, Dronedarona, Amiodarona, Diltiazem, Eplerenona, Ivabradina, Lovastatina, Simvastatina, Atorvastatina, Ranolazina, Ticagrelor, Tamsulosina, Roflumilast, Zuclopentixol, Carbamazepina, Fenitoina, Rifampicina, Quetiapina, Pimozida, Alcaloides ergóticos, Cisaprida, Midazolam, Triazolam

Afluzosina, Aprepitant, Bromicriptina, Eletriptan, Budesonida, Salmeterol, Quinidina, Conivaptan, Tolvaptan, Duloxetina, Everolimus, Tacrolimus, Pimecrolimus, Natalizumab, Sildenafil, Leflunomida, Fármacos contra el cáncer

Hierba de San Juan, Equinaceas

¿Cómo debo conservar IDELALISIB?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Observaciones:

Para el tratamiento de la leucemia, idelalisib debe ir acompañado de rituximab u ofatumumab.

Idelalisib requiere una manipulación especial. Consulte la hoja “Manipulación de fármacos especiales