

¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
 - Dolor de cabeza, falta de apetito, alteraciones del gusto, diarrea, náuseas, vómitos, cansancio, infecciones y alteraciones gastrointestinales (como indigestión).
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
 - Dolor abdominal.
- Graves (menos de 1 de cada 1000 personas):
 - Alteraciones hematológicas.

Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la hoja “¿Qué hago si....?”

¿OLAPARIB puede interaccionar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con olaparib son:

Conivaptan, Eritromicina, Diltiazem, Fluconazol, Verapamilo
Fenitoína, rifampicina, Carbamazepina, Nevirapina, Fenobarbital
Naranja Amarga, Hierba de San Juan, zumo de pomelo

¿Cómo debo conservar OLAPARIB?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar las cápsulas en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Observaciones:

Por norma general, las pacientes deben iniciar el tratamiento con Olaparib, no más tarde de transcurridas 8 semanas después de la finalización de su última dosis del régimen que contiene platino.

Olaparib requiere una manipulación especial. Consulte la hoja “Manipulación de fármacos especiales.