

¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
 - Diarrea, náuseas, vómitos, estreñimiento, dolor abdominal, disnea, cansancio, reacciones dérmicas, dolor óseo/muscular, falta de apetito, insomnio, dolor de cabeza, aumento de infecciones y aumento de la tensión arterial.
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
 - Alteraciones cardíacas, pancreatitis, sudoración, disfunción eréctil.
- Graves (menos de 1 de cada 1000 personas):
 - Alteraciones hepáticas.

Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la hoja “¿Qué hago si....?”

¿PONATINIB puede interaccionar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con ponatinib son:

Claritromicina, Itraconazol, Ketoconazol, Ritonavir, Voriconazol, Fluconazol, Rifampicina
Carbamazepina, Fenobarbital, Fenitoina, Nefazodona, Digoxina, Dabigatran, Pravastatina, Rosuvastatina
Metotrexato, sulfasalazina, Colchicina
Hierba de San Juan, Zumo de pomelo, Equinaceas

¿Cómo debo conservar PONATINIB?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Observaciones:

Ponatinib requiere una manipulación especial. Consulte la hoja “Manipulación de fármacos especiales