

¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
 - Aumento de infecciones, falta de apetito, diarrea, náuseas, vómitos, reacciones dérmicas (síndrome mano-pie, irritación de boca y manos), aumento de tensión arterial, fiebre, escalofríos.
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
 - Alteraciones del gusto, trastornos gastrointestinales, dolor de cabeza y fragilidad/perdida capilar
- Graves (1 de cada 1000 personas)
 - Leucoencefalopatía posterior reversible, alteraciones cardíacas, hepáticas graves y reacciones dérmicas graves.

Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la hoja “¿Qué hago si....?”

¿REGORAFENIB puede interaccionar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con regorafenib son:

Ketoconazol, Claritromicina, Vorioconazol, Rifampicina
Fenitoína, Carbamacepina, Fenobarbital, Conivaptan
Irinotecan, Metotrexato, Atorvastatina
Hierba de San Juan, Zumo de pomelo

¿Cómo debo conservar REGORAFENIB?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja, la funda protectora y el estuche después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Observaciones:

Regorafenib requiere una manipulación especial. Consulte la hoja “Manipulación de fármacos especiales