

¿Qué es RUXOLITINIB?

Es un medicamento (inhibidor de proteína quinasa) que impide que impide el crecimiento de células tumorales, utilizado en el tratamiento de la **mielofibrosis y policitemia vera**.



¿Qué dosis debo tomar?

Debe tomar un comprimido dos veces al día:

Excipientes: lactosa

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

¿Cómo debería tomar RUXOLITINIB?

Deberá tomar la dosis indicada **con o sin alimentos dos veces al día**.

No fraccione ni mastique los comprimidos.

¿Qué hago si olvido una dosis?

NO tome la dosis olvidada, y continúe su tratamiento con normalidad.

En caso de vómito, **NO tome otra dosis** ese día, y continúe su tratamiento con normalidad.

¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a ruxolitinib o alguno de sus excipientes.
- Historial de enfermedad renal, hepática, infecciones, leucoencefalopatía multifocal y/o cáncer.
- Antes de administrar vacunas por riesgo aumentado de infección.
- Embarazo y lactancia.

¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
 - Aumento de infecciones, dolor de cabeza, mareo, aumento de peso, hematomas y aumento de la tensión arterial.
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
 - Sangrado, gases, herpes,
- Graves (menos de 1 de cada 1000 personas):
 - Alteraciones hematológicas.

Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la hoja “¿Qué hago si....?”

¿RUXOLITINIB puede interactuar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con ruxolitinib son:

Conivaptan, Natalizumab, Metamizol, Pimecrolimus, Tacrolimus
Carbamazepina, Fenobarbital, Fenitoina, Rifampicina, Rifabutina,
Claritromicina, Itraconazol, Ketoconazol, Lopinavir, Ritonavir, Posaconazol, Fluconazol, Voriconazol
Dabigatran, Ciclosporina, Digoxina
Hierba de San Juan

¿Cómo debo conservar RUXOLITINIB?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Observaciones:

Ruxolitinib requiere una manipulación especial. Consulte la hoja “Manipulación de fármacos especiales