

¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
 - Diarrea, estreñimiento, náuseas, vómitos, dolor abdominal, cansancio, tos, reacciones dérmicas, sangrado (encías, nariz, hemorroides, vaginal etc..), fragilidad/perdida capilar, alteraciones visuales y aumento de la tensión arterial.
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
 - Reacciones alérgicas, alteraciones cardiacas, arritmias.
- Graves (menos de 1 de cada 1000 personas):
 - Perforación intestinal, rabdomiolisis, alteraciones cardiacas graves, neumonitis, enfermedad pulmonar intersticial.

Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la hoja “¿Qué hago si....?”

¿TRAMETINIB puede interaccionar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con trametinib son:

Verapamilo, Ciclosporina, Itraconazol
Ritonavir, Quinidina

¿Cómo debo conservar TRAMETINIB?

- Se debe conservar en nevera (2-8°C). NUNCA EN CONGELADOR. Debe conservar el fármaco en el envase original..
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Observaciones:

Trametinib requiere una manipulación especial. Consulte la hoja “Manipulación de fármacos especiales