

¿Qué es VANDETANIB?

Es un antineoplásico (inhibidor de tirosina quinasa) que impide la diseminación de células tumorales, utilizado en el tratamiento del **cáncer tiroides**.



¿Qué dosis debo tomar?

Debe tomar un comprimido una vez al día:

Excipientes:

Horario																		
6	7		9	10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22		24

¿Cómo debería tomar VANDETANIB?

Deberá tomar la dosis indicada **con o sin alimentos una vez al día**.

No fraccione ni mastique los comprimidos.

¿Qué hago si olvido una dosis?

Tómela si quedan más de 12 horas para la próxima dosis, y continúe su tratamiento con normalidad.

En caso de vómito, **NO** tome otra dosis ese día, y continúe su tratamiento con normalidad.

¿Qué debe contarle a su médico y farmacéutico antes de empezar el tratamiento?

- Historial de alergia a vandetanib o alguno de sus excipientes.
- Historial de enfermedad cardiaca y/o fotosensibilidad.
- Antes de administrar vacunas por riesgo aumentado de infección.
- Embarazo y lactancia.

¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
 - Aumento de infecciones, dolor de cabeza, falta de apetito, insomnio, depresión, dolor abdominal, diarrea, náuseas, reacciones cutáneas, cansancio, confusión y aumento de la tensión arterial.
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
 - Ansiedad, somnolencia, alteraciones visuales, estreñimiento, deshidratación, fragilidad/perdida capilar, síndrome mano-pie, neumonía y pérdida de peso.
- Graves (menos de 1 de cada 1000 personas):
 - Alteraciones cardíacas y digestivas (como pancreatitis).

Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la hoja “¿Qué hago si....?”

¿VANDETANIB puede interaccionar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con vandetanib son:

Cisaprida, Eritromicina, Ivabradina, Metadona, Sulpirida,
Digoxina, Metformina, Acenocumarol, Warfarina
Itraconazol, Rifampicina, Carbamazepina, Fenobarbital
Hierba de San Juan, Zumo de pomelo

¿Cómo debo conservar VANDETANIB?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar los comprimidos en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja, la funda protectora y el estuche después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Observaciones:

Vandetanib requiere una manipulación especial. Consulte la hoja “Manipulación de fármacos especiales