

¿Qué efectos adversos puedo tener?

- Muy frecuentes (1 de cada 10 personas):
 - Diarrea, estreñimiento, náuseas, vómitos, pérdida de peso, reacciones cutáneas, dolor óseo/muscular, fragilidad/perdida capilar, falta de apetito y alteraciones del gusto.
- Frecuentes (5 de cada 100 personas):
 - Dolor abdominal, y cansancio.
- Graves (menos de 1 de cada 1000 personas):
 - Fusión prematura de epífisis.

Podemos aliviar algunos de estos síntomas siguiendo las instrucciones de la hoja “¿Qué hago si....?”

¿VISMODEGIB puede interactuar con otros medicamentos?

Debe informar a su médico y farmacéutico de toda la medicación y productos naturales que tome. Algunos de los medicamentos que producen interacciones con vismodegib son:

Rifampicina
Antiácidos y protectores de estómago (Omeprazol, Pantoprazol)
Carbamazepina, Fenitoína
Hierba de San Juan

¿Cómo debo conservar VISMODEGIB?

- A temperatura ambiente, alejado de la humedad, el calor y la luz. Debe conservar las cápsulas en el envase original.
- En el caso de que le sobre medicación, devuélvala lo antes posible al Servicio de Farmacia de su Hospital.
- No utilice este medicamento después de la fecha de caducidad que aparece en la caja después de "CAD". La fecha de caducidad es el último día del mes que se indica.

Observaciones:

Vismodegib requiere una manipulación especial. Consulte la hoja “Manipulación de fármacos especiales