










ADMINISTRACIÓN ANTICUERPOS

NOVIEMBRE 2019

		DOSIFICACIÓN		PREMEDICACIÓN			RIESGO SLC/HS	TIEMPO (MIN)	PRUEBAS Y OTROS
			CICLO	-H1	P	C			
ATEZOLIZUMAB		1200 mg	21					60 → 30*	
BEVACIZUMAB		5-10 mg/Kg 7,5-15 mg/Kg	14 21				<3%	90/60/30	TA Y TIRA
CETUXIMAB		400 mg/m ² 250 mg/m ² 500 mg/m ²	7 14				20-25%	120/60	
DURVALUMAB		10 mg/Kg	14					60	FILTRO
IPIILIMUMAB		3 mg/Kg	21				<4%	90	FILTRO
NIVOLUMAB		240 mg 480 mg	14 28				<5%	240 : 30 480 : 60	FILTRO
PANITUMUMAB		6 mg/Kg	14				<4%	60	FILTRO
PEMBROLIZUMAB		200 mg 400 mg	21 42					30	   FILTRO
PERTUZUMAB		840 mg 420 mg	21				13%	60 → 30*	
RAMUCIRUMAB		8 mg/Kg	1-8 28					60	TA Y TIRA FILTRO
RITUXIMAB		375-500 mg/m ² SC: 1400 mg	7-28 60				>50%	1ª: 50-400 mg/h 2+: 100-400 mg/h	Aumentos de 50 mg/h cada 30 minutos
TRASTUZUMAB		4 IV: 2 mg/Kg 8 SC: 600 mg	7 21				20-40%	IV: 90/60/30 SC: 5	 8 mg/Kg 6 21
TRASTUZUMAB-EMTASINA		3,6 mg/Kg	21				<5%	90/30	

DOSIS DE CARGA
mg/Kg

C/ DIAS

ANTIHI
TAMÍNICO

PARACE
TAMOL

CORTI
COIDE

* SI NO HAY REACCIÓN PREVIA

@AMONTERODEL 2019