

POSOLOGIA

EVEROLIMUS se administra por **via oral**

La dosis recomendada es según prescripción médica



¿CÓMO se debe TOMAR Everolimus?

- Debe tomarlo con o sin alimentos.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma
- Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar en la boca.
- Mantenga siempre el mismo horario.

¿QUÉ HACER SI...?:

- Si se ha olvidado de tomar una dosis: tómela lo antes posible. Si han transcurrido más de 12 horas espere a la siguiente toma y no doble nunca la dosis.
- Si vomita no repita la dosis.
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

¿Cuándo NO debe tomar Everolimus?

- Si usted es alérgico a everolimus o derivados de rapamicina (sirolimus o temsirolimus), así como a cualquiera de los componentes del comprimido como lactosa
- Si está embarazada o en período de lactancia

PRECAUCIONES

- Adopte 2 medidas anticonceptivas si usted o su pareja puede quedarse embarazada y manténgalas hasta 2 semanas después de haber finalizado el tratamiento.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.
- Protéjase del sol con ropa adecuada y crema con filtro solar de protección superior a 15.
- Si tiene diabetes, everolimus puede aumentar los niveles de glucosa en la sangre.
- Si tiene colesterol, everolimus puede aumentar los niveles de colesterol y grasas de la sangre.
- Si ha sufrido hepatitis B, puede reactivarse con el tratamiento.
- Deben evitarse enjuagues bucales que contenga alcohol o agua oxigenada.

INTERACCIONES

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Antifúngicos: ketoconazol, itraconazol, posaconazol, fluconazol y voriconazol.
- Ciclosporina.
- Antibióticos: eritromicina, claritromicina, telitromicina, rifampicina.
- Antivirales: atazanavir, darunavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, efavirenz, nevirapina, amprenavir.
- Antiepilépticos : fenobarbital. carbamazepina, fenitoína
- Antihipertensivos: diltiazem, verapamilo
- Aprepitant, corticoides.
- Hierba de San Juan o hipérico.
- Pomelo o zumo de pomelo

EFFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Diarrea, náuseas, vómitos.
- Erupción, sequedad de la piel, picor, granos y/o acné, lagrimeo de los ojos con picor, enrojecimiento e hinchazón.
- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Debe tomar medidas higiénicas
- Dolor, enrojecimiento, o llagas en la boca
- Alteraciones del gusto, disminución del apetito, fatiga, astenia.
- Edema periférico (hinchazón brazos, manos, pies, tobillos)
- Hipertensión.

- Dolor de cabeza, insomnio

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave: (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar...).
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre > 38°C, dificultad al orinar.
- Signos de sangrado como heces negras, sangre en la orina o hematomas importantes.
- Ojos o piel amarillentos
- Oscurecimiento de la orina o heces blanquecinas.
- En caso de sobredosis.

CONSERVACIÓN

Mantenga los comprimidos en su envase original, a temperatura ambiente, protegidos de la luz y de la humedad.

CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de los comprimidos.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

Días	Nº comprimidos / día	
	5 mg	10 mg

Notas:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.

COMO CONTACTAR

Teléfono Farmacia

Horario

Logo Hospital



INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

EVEROLIMUS

Afinitor®

Comprimidos 5, 10 mg

Nombre paciente:

Fecha: