

INDICACIÓN

FILGRASTIM se utiliza para estimular la producción de glóbulos blancos en la médula ósea.

POSOLOGIA

Filgrastim se administra por **vía subcutánea** (debajo de la piel).


La dosis recomendada es según prescripción médica.

¿CÓMO se debe ADMINISTRAR Filgrastim?

La administración de la inyección se debe realizar siguiendo los siguientes pasos:

1. Deje la jeringa precargada fuera de la nevera, a temperatura ambiente, durante 30 minutos, o sostenga la jeringa precargada suavemente entre sus manos durante unos minutos.
2. No agite la jeringa precargada.
3. No retire la cubierta de la aguja hasta que esté preparado para la inyección.
4. Compruebe el aspecto de la jeringa. Debe ser un líquido transparente e incoloro. No lo utilice si observa decoloración, turbidez o partículas en el mismo.
5. Lávese las manos cuidadosamente.
6. **Preparación de la inyección,**

- Para evitar que la aguja se doble, tire suavemente de la cubierta de la aguja sin girarla, tal como se muestra en las figuras.



- No toque la aguja ni empuje el émbolo.

- Puede que observe una pequeña burbuja de aire en la jeringa precargada. Debe extraer la burbuja de aire.

7. Desinfecte la piel de la zona de inyección usando un algodón con alcohol y pellizque la piel entre los dedos pulgar e índice, sin apretar.

8. Introduzca la aguja en toda su longitud formando un ángulo de 45°.

9. Tire ligeramente del émbolo para asegurarse de que no se ha pinchado una vena. Si ve sangre en la jeringa, retire la aguja e insértela en otro lugar.

10. Manteniendo la piel pellizcada presione el émbolo de forma lenta y constante. No deje ir la presión del émbolo.

11. Una vez administrado el líquido, retire la aguja mientras mantiene la presión sobre el émbolo y deje ir la piel.

12. Deje ir el émbolo y en ese momento el protector de seguridad de la aguja se desplazará rápidamente hasta cubrir la aguja

13. Desinfecte la piel con alcohol.

Para cada administración, debe cambiar el lugar de inyección, alternando entre la parte trasera del brazo, el abdomen y la parte superior del muslo.

La primera dosis deberá administrarse a partir de las 24 horas siguientes a la finalización de la quimioterapia. Mantenga

siempre el mismo horario.

¿QUÉ hacer si...?

- Si se ha olvidado de administrar la inyección, hágalo lo antes posible. Si han transcurrido más de 12 horas espere a la siguiente administración y no doble nunca la dosis.
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

Cuándo NO se debe administrar Filgrastim?

- Si es alérgico a Filgrastim, así como a cualquiera de los componentes de la solución.
- Si es intolerante al sorbitol (un tipo de azúcar).
- Si padece el Síndrome de Kostmann.
- Si está en periodo de lactancia.
- Si está embarazada o en periodo de lactancia.

PRECAUCIONES

- No administrar el mismo día de la quimioterapia ni 24 horas antes de iniciar quimioterapia.

- INTERACCIONES

No se han descrito.

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.

EFFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Dolor muscular y óseo
- Dolor de cabeza
- Reacción en el lugar de inyección: enrojecimiento, picor, inflamación, dolor.
- Cansancio, pérdida del apetito
- Náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea
- Tos.
- Osteoporosis

Comente con su médico o farmacéutico si presenta alguno de éstos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avise rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave (enrojecimiento de la piel, dificultad para respirar,...).
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre > 38°C, dificultad al orinar.
- Signos de sangrado como heces negras, sangre en la orina o hematomas importantes.
- Palpitaciones
- Dolor en la parte superior izquierda de la barriga (abdominal) o dolor en el hombro izquierdo.
- En caso de sobredosis.

CONSERVACIÓN

Mantenga las inyecciones en su envase original, **dentro de la nevera** (entre 2 y 8°) **NO CONGELAR**



CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de los viales

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

DÍAS	Nº INYECCIONES		Frecuencia
	30MU	48MU	

Notas:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

CÓMO CONTACTAR

Teléfono Farmacia

Horario

LOGO HOSPITAL



INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS



FILGRASTIM
TEVAGRASTIM®

Nombre del paciente:

Fecha: