

## INDICACIÓN

APREPITANT se utiliza conjuntamente con otros fármacos para la prevención de náuseas y vómitos provocados por la quimioterapia

## POSOLOGIA

Aprepitant se administra por **via oral**  
Dia 1 de la Quimioterapia: Una cápsula de 125 mg (1 hora antes de QT)



Días 2 y 3: una cápsula de 80 mg por la mañana.

### Esquema A

	Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4
Aprepitant	125 mg	80 mg	80 mg	-----
Dexametasona	12mg v.o/iv	8mg v.o	8mg v.o	8mg v.o
Setrón	i.v/or			

### Esquema B

	Dia 1	Dia 2	Dia 3
Aprepitant	125 mg	80 mg	80 mg
Dexametasona	12mg v.o/iv		
Setrón	v.o/iv		

## ¿COMO se debe TOMAR Aprepitant?

- Puede tomarse con o sin alimentos
- Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar en la boca, ni disolver.
- Mantenga siempre el mismo horario

## ¿QUÉ hacer si...?

- Si se ha olvidado de tomar una dosis tómela lo antes posible. Si han pasado más de 12 horas espere al día siguiente y no doble nunca la dosis.
- Si vomita no repita la dosis.
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

## ¿Cuando NO debe tomar Aprepitant?

- Si usted es alérgico a aprepitant, así como a cualquiera de los componentes de la cápsula.
- Si tiene intolerancia a la fructosa.
- Si toma terfenadina, pimozida.
- Si está embarazada o en periodo de lactancia.

## PRECAUCIONES:

- Si tiene una enfermedad hepática.
- Adopte 2 medidas anticonceptivas si usted o su pareja puede quedarse embarazada y manténgalas hasta 4 semanas después de haber finalizado el tratamiento.

## INTERACCIONES

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma :

- Quimioterapia: etoposido, vinorelbina, paclitaxel y docetaxel
- Corticoides: dexametasona y metilprednisolona
- Antifúngicos (para tratar infecciones por hongos): ketoconazol, voriconazol.
- Antibióticos: claritromicina, telitromicina, rifampicina.
- Ansiolíticos: Alprazolam, Triazolam
- Antiepilépticos: fenitoina, fenobarbital, carbamazepina, .
- Anticonceptivos orales
- Otros: warfarina, tolbutamida, astemizol.
- Hipérico o Hierba de San Juan.
- Zumo de pomelo

## EFFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos mas frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Estreñimiento, diarrea, indigestión, hipo
- Alteraciones hepáticas leves
- Fatiga, cansancio, anorexia
- Dolor de cabeza

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

### CONSERVACIÓN

Mantenga las cápsulas en su envase original, a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de la humedad.

### CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

### ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de las cápsulas.

### RECOMENDACIONES AL PACIENTE

Notas:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.

### CÓMO CONTACTAR

Teléfono Farmacia:

Horario:

Logo Hospital



## INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS



## APREPITANT

Emend®

Cápsulas 125 i 80 mg

Nombre paciente:

Fecha: