

POSOLOGIA

IMATINIB se administra por **via oral**
La dosis recomendada es según prescripción médica



COMO se debe TOMAR Imatinib?

- Tomar con alimentos, preferentemente por la mañana.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma
- Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua, sin masticar ni chupar.
- Si tiene problemas para tragar puede disolverlos en agua y tomarlos inmediatamente.
- Mantenga siempre el mismo horario.

QUE HACER SI...?:

- Si se ha olvidado de tomar una dosis: tómela lo antes posible. Si han transcurrido mas de 12 horas espere a la siguiente toma y no doble nunca la dosis.
- Si vomita no repita la dosis.
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

Cuando NO debe tomar Imatinib?

- Si usted es alérgico a imatinib así como a cualquiera de los componentes del comprimido.
- Si está embarazada o en período de lactancia

PRECAUCIONES

- Si padece una enfermedad hepática.
- Si ha sufrido una enfermedad que afecte de manera importante la absorción intestinal o si se ha sometido a una resección quirúrgica de intestino o estómago.
- Adopte 2 medidas anticonceptivas si usted o su pareja puede quedarse embarazada y manténgalas hasta 2 semanas después de haber finalizado el tratamiento.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.
- Se recomienda usar gel de baño sin detergente, cremas hidratantes de avena o aloe vera y champú suave.
- Protéjase del sol con ropa adecuada y crema con filtro solar de protección superior a 15.

INTERACCIONES

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma tratamiento para:

- Antifúngicos (para tratar infecciones por hongos): ketoconazol, itraconazol, voriconazol.
- Antibióticos: eritromicina, claritromicina, rifampicina, telitromicina, .
- Antivirales: atazanavir, indinavir, nefazodona, nelfinavir, ritonavir, saquinavir.
- Antiepilépticos : fenobarbital. carbamazepina, fenitoína
- Anticoagulantes: warfarina, acenocumarol
- Corticoides: dexametasona
- Otros: paracetamol, levotiorixina, simvastatina
- Hierba de San Juan o hipérico
- Zumo de pomelo.

EFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos mas frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Dolor de cabeza
- Vómitos, náuseas
- Diarrea, estreñimiento
- Indigestión
- Erupciones cutáneas
- Inflamación de los tobillos, cara.
- Disminución del apetito.
- Cansancio
- Dolor de las articulaciones
- Calambres musculares

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave: (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar...).
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre > 38°C, dificultad al orinar.
- Signos de sangrado como heces negras, sangre en la orina o hematomas importantes.
- Aumento rápido de peso
- Dificultad para respirar
- En caso de sobredosis.

CONSERVACIÓN

Mantenga los comprimidos en su envase original, a temperatura ambiente, protegidos de la luz y de la humedad.

CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de los comprimidos.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

DIAS	N° COMPRIMIDOS		Frecuencia
	100mg	400mg	

Notas:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.

COMO CONTACTAR

Teléfono Farmacia

Horario

Logo Hospital



INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS



IMATINIB

Glivec®

Comprimidos 400 y 100 mg

Nombre paciente:

Fecha: