

POSOLOGIA

LENALIDOMIDA se administra por **vía oral**.

La dosis recomendada es según prescripción médica.



¿COMO se debe TOMAR Lenalidomida?

- Puede tomarse con o sin alimentos.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma.
- Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar en la boca, ni disolverlas.
- Mantenga siempre el mismo horario.

¿QUÉ HACER SI...?

- Si se ha olvidado de tomar una dosis: tómela lo antes posible. Si han transcurrido mas de 12 horas espere a la siguiente toma y no doble nunca la dosis.
- Si vomita, únicamente repita la dosis si ha transcurrido menos de 30 minutos desde la toma.
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

¿Cuándo NO debe tomar Lenalidomida?

- Si usted es alérgico a lenalidomida así como a cualquiera de los componentes de la cápsula como lactosa.
- Si está embarazada o en periodo de lactancia

PRECAUCIONES

- Si tiene enfermedad renal
- Si tiene alguna alteración de la coagulación de la sangre.
- Adopte 2 medidas anticonceptivas si usted o su pareja puede quedarse embarazada y manténgalas hasta 4 meses después de haber finalizado el tratamiento.
- Este medicamento es teratogénico y puede afectar al feto
- No puede donar sangre ni semen durante el tratamiento y hasta 4 semanas después de finalizar el tratamiento
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.

INTERACCIONES

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Anticonceptivos orales
- Digoxina.
- Anticoagulantes: warfarina, acenocumarol

EFFECTOS ADVERSOS

Las reacciones adversas más frecuentes que no significa que aparezcan en todos los pacientes son:

- Palpitaciones.
- Mareos, dolor de cabeza, vértigo
- Temblores, hormigueo
- Debilidad muscular, cansancio.
- Diarrea o estreñimiento, náuseas
- Aumento o disminución del peso.
- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Debe tomar medidas higiénicas.
- Visión borrosa, aumento del lagrimeo.
- Erupción cutánea, prurito, sequedad de la piel.
- Trombosis venosa profunda, hipotensión, hipertensión, rubor.
- Trastornos del sueño, fatiga, edema.

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave: (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar...).
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre > 38°C, dificultad al orinar.
- Signos de sangrado como heces negras, sangre en la orina o hematomas importantes.
- Dolor torácico y/o dolor en las piernas
- En caso de sobredosis.

CONSERVACIÓN

Mantenga las cápsulas en su envase original, a temperatura ambiente, protegidos de la luz y de la humedad

CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de las cápsulas.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

DÍAS	Nº CÁPSULAS				Frecuencia
	5 mg	10 mg	15 mg	25 mg	

Notas:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.

COMO CONTACTAR

Teléfono Farmacia

Horario

LOGO HOSPITAL



INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

Revlimid® 25_{mg}
Cápsulas duras
lenalidomida

Vía oral

Revlimid® 15_{mg}
Cápsulas duras
lenalidomida

Vía oral

Revlimid® 10_{mg}
Cápsulas duras
lenalidomida

Vía oral

LENALIDOMIDA

Revlimid®

Cápsulas 5, 10, 15 y 25 mg

Nombre del paciente:

Fecha: