

INDICACIÓN

LENOGRASTIM se utiliza para estimular la producción de glóbulos blancos en la médula ósea.


POSOLOGIA

Lenograstim se administra por **vía subcutánea** (debajo de la piel). La dosis recomendada es según prescripción médica

¿CÓMO se debe ADMINISTRAR Lenograstim?

La administración de la inyección se debe realizar siguiendo los siguientes pasos:

1. Lave las manos cuidadosamente.
2. Retire el protector de goma del vial y limpie la parte superior con una toallita con alcohol.
3. Retire la funda protectora de la jeringa e inserte en ella la "AGUJA AMARILLA" con su tapón. Retirar el tapón.
4. Perfore el tapón de goma del vial e introduzca el contenido de la jeringa precargada, lentamente para no formar espuma. Agitar con suavidad hasta que el polvo esté totalmente disuelto.
5. Dé la vuelta al vial y sujetándolo con una mano, tire del émbolo hasta conseguir la dosis de la solución que se debe inyectar.
6. Tape la aguja con su tapón. Retire la aguja y el tapón.



7. Inserte la "AGUJA MARRÓN" con su tapón en la jeringa.

8. Sujete la jeringa con la aguja hacia arriba y compruebe que no hay burbujas. Si hubiera burbujas golpee levemente la jeringa con un dedo para que las burbujas vayan hacia arriba y una vez allí empuje levemente el émbolo para eliminarlas.




9. Desinfecte la piel de la zona de inyección usando un algodón con alcohol y pellizque la piel entre los dedos pulgar e índice, sin apretar.



10. Retire el tapón de la aguja e introduzca la aguja con una inclinación de 45°. Inyecte lentamente el contenido de la jeringa, presionando el émbolo.

11. Al terminar la inyección, retire la aguja y suelte la piel. Coloque de nuevo el tapón en la jeringa y desinfecte la piel con alcohol.



Para cada administración, debe cambiar el lugar de inyección, alternando entre la parte trasera del brazo, el abdomen y la parte superior del muslo.

Mantenga siempre el mismo horario

¿QUÉ hacer si...?

- Si se ha olvidado de administrar la inyección, hágalo lo antes posible. Si han transcurrido más de 12 horas espere a la siguiente administración y no doble nunca la dosis.
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

Cuándo NO se ha de administrar Lenograstim?

- Si usted es alérgico a lenograstim, así como a alguno de los componentes de la solución (arginina, fenilalanina, metionina, manitol, polisorbato 20 y ácido clorhídrico diluido).
- Si padece "fenilcetonuria".
- Si está embarazada o en periodo de lactancia
- En niños menores a 2 años.

PRECAUCIONES

No administrar el mismo día de la quimioterapia ni 24 horas antes de iniciar quimioterapia.

INTERACCIONES

No se han descrito.

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal.

EFFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Dolor abdominal muscular y óseo.
- Dolor de cabeza.
- Reacción en el lugar de inyección: enrojecimiento, picor, inflamación, dolor.
- Febrícula, reacciones alérgicas
- Fatiga, cansancio.
- Náuseas, vómitos, diarrea
- Tos.
- Osteoporosis.

Comente con su médico o farmacéutico si presenta alguno de éstos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave (enrojecimiento de la piel, dificultad para respirar,...).
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre > 38°C, dificultad al orinar.
- Signos de sangrado como heces negras, sangre en la orina o hematomas importantes.
- Palpitaciones
- Dolor en la parte superior izquierda de la barriga (abdominal) o dolor en el hombro izquierdo.
- En caso de sobredosis.

CONSERVACIÓN

Mantenga en su envase original a temperatura no superior a 30°C y protegido de la luz y de la humedad.

CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de los viales.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

DÍAS	Nº INYECCIONES		Frecuencia
	13	34	

Notas:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

CÓMO CONTACTAR

Teléfono Farmacia

Horario

LOGO DEL
HOSPITAL



INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

LENOGRASTIM
GRANOCYTE®

Nombre del paciente:

Fecha: