

CONSERVACIÓN

Mantenga los comprimidos en su envase original a temperatura ambiente, protegidos de la luz y de la humedad.

CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de los comprimidos

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

Notas:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

COMO CONTACTAR

Teléfono Farmacia

Horario

Logo Hospital



INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS



MERCAPTOPURINA
MERCAPTOPURINA WELLCOME®
comprimidos de 50 mg

Nombre del Paciente:

Fecha:

POSOLOGÍA:

MERCAPTOPURINA se administra por **vía oral**.

La dosis recomendada es según prescripción médica.



¿CÓMO se debe TOMAR Mercaptopurina?

- Debe tomarlo sin alimentos, es decir, 1 hora antes o dos horas después de comer.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma.
- Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar, ni disolverlos.
- Mantenga siempre el mismo horario,

¿QUÉ hacer si...?

- Si se ha olvidado de tomar una dosis: tómela lo antes posible. Si han transcurrido más de 12 horas espere a la siguiente toma y no doble nunca la dosis.
- Si vomita, únicamente repita la dosis si ha transcurrido menos de 1 hora desde la toma.
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

¿Cuándo NO debe tomar Mercaptopurina?

- Si usted es alérgico a mercaptopurina o tioguanina, así como a alguno de los componentes del comprimido como lactosa.
- Si presenta déficit de tiopurinmetiltransferasa.
- Si está embarazada o en período de lactancia.

PRECAUCIONES:

- Si tiene enfermedad hepática grave
- Si tiene enfermedad renal
- Si tiene gota
- Si ha sufrido alguna enfermedad que afecte de manera importante la absorción intestinal o si se ha sometido a una reducción quirúrgica de intestino o estómago.
- Adopte 2 medidas anticonceptivas si usted o su pareja puede quedarse embarazada.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.

INTERACCIONES:

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma.

- Antibióticos: trimetoprim-sulfametoxazol.
- Anticoagulantes: warfarina, acenocumarol
- Otros: alopurinol, azatioprina, sulfasalazina

EFFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos más frecuentes que no significa que aparezcan en todos los pacientes son:

- Cansancio.
- Náuseas y vómitos
- Dolores musculares y articulaciones.
- Cambio color de la piel
- Llagas en la boca
- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Debe tomar medidas higiénicas.
- Puede aumentar el riesgo de hemorragias, tenga cuidado con los utensilios que corten.

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avisé rápidamente su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave: (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar...).
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre > 38°C, dificultad al orinar.
- Signos de sangrado como heces negras, sangre en la orina o hematomas importantes.
- Ojos o piel amarillentos
- Oscurecimiento de la orina o heces blanquecinas.
- En caso de sobredosis.