

## POSOLOGIA

NILOTINIB se administra por **vía oral**.

La dosis recomendada es según prescripción médica .



### ¿CÓMO se debe TOMAR Nilotinib?

- Debe tomarlo sin alimentos, es decir, 1 hora antes o dos horas después de comer.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma.
- Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua, sin masticar, chupar, ni disolver.
- Mantenga siempre el mismo horario

### ¿QUÉ hacer si...?

- Si se ha olvidado de tomar una dosis: tómela lo antes posible. Si han transcurrido más de 6 horas espere a la siguiente toma y no doble nunca la dosis.
- Si vomita no repita la dosis.
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

### Cuando NO debe tomar Nilotinib?

- Si usted es alérgico a Nilotinib, así como a cualquiera de los componentes de la cápsula como lactosa.
- Si está embarazada o en período de lactancia.

## PRECAUCIONES:

- Si toma inhibidores de la bomba de protones (omeprazol, pantoprazol...) o antagonistas-H2 (ranitidina).
- Si sufre enfermedad hepática grave.
- Si ha sufrido alguna enfermedad que afecte de forma importante a la absorción intestinal o si ha sido sometido a una resección quirúrgica de intestino o estómago.
- Adopte 2 medidas anticonceptivas si usted o su pareja puede quedarse embarazada.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.
- Se recomienda usar gel de baño sin detergente, cremas hidratantes de avena o aloe vera y champú suave.
- Protéjase del sol con ropa adecuada y crema con filtro solar de protección superior a 15.

## INTERACCIONES:

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Antifúngicos (para tratar infecciones por hongos): ketoconazol, itraconazol, voriconazol.
- Antibióticos: eritromicina, claritromicina, telitromicina, rifampicina.
- Antiepilépticos: fenitoína, carbamazepina, fenobarbital.
- Anticoagulantes: acenocumarol, warfarina
- Otros: dexametasona
- Hierba de San Juan o hipérico.
- Zumo de pomelo

## EFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes son:

- Cansancio, dolor de cabeza
- Febrícula
- Caída leve del pelo
- Dolores musculares y las articulaciones,
- Erupción cutánea, picor
- Náuseas, vómitos
- Estreñimiento o diarrea.
- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Debe tomar medidas higiénicas.
- Puede aumentar el riesgo de hemorragias, tenga cuidado con los utensilios que corten.

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

### **Avisé rápidamente a su médico si tiene:**

- Una reacción alérgica grave: (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar...).
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre > 38°C, dificultad al orinar.
- Signos de sangrado como heces negras, sangre en la orina o hematomas importantes.
- Dolor de garganta
- En caso de sobredosis.

### CONSERVACIÓN

Mantenga las cápsulas en su envase original a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de la humedad

### CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

### ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de los cápsulas.

### RECOMENDACIONES AL PACIENTE

Notas:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.

### CÓMO CONTACTAR

Teléfono Farmacia

Horario

Logo Hospital



## INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

**NILOTINIB**  
**TASIGNA®**  
Cápsulas de 200 mg

Nombre del Paciente:

Fecha:





