

INDICACIÓN

POSACONAZOL está indicado en el tratamiento y prevención de algunas infecciones producidas por hongos.

POSOLOGIA

Posaconazol se administra por **vía oral**, en forma de jarabe. La dosis recomendada es según prescripción médica.



¿CÓMO se debe TOMAR Posaconazol?

- Tomar con las comidas para evitar molestias gástricas.
- Agitar bien el jarabe antes de cada uso para mezclar el fármaco de forma homogénea. Utilizar el vaso dosificador para tomar la dosis pautada.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de la toma.
- Mantenga siempre el mismo horario

¿QUÉ hacer si...?

- Si se ha olvidado de tomar una dosis tómela lo antes posible. Si han pasado más de 6 horas espere a la siguiente toma y no doble nunca la dosis.
- Si vomita no repita la dosis.
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

¿Cuándo NO debe tomar Posaconazol?

- Si usted es alérgico a posaconazol así como a alguno de los componentes de la solución.
- Si es intolerante a la glucosa-galactosa.
- Si está embarazada o en periodo de lactancia.
- Si está en tratamiento con:
 - Terfenazina, Astemizol.
 - Quinidina.
 - Alcaloides ergotamínicos.
 - Simvastatina, lovastatina, atorvastatina.
 - Pimozida

PRECAUCIONES

- Si tiene un enfermedad hepática.
- Si tiene un enfermedad cardíaca.
- Adopte 2 medidas anticonceptivas si usted o su pareja puede quedarse embarazada.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.

INTERACCIONES

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Antiepilépticos: Carbamazepina, fenobarbital, fenitoina, primidona.
- Antituberculostáticos (para tratar tuberculosis) : Rifabutina, Rifampicina.
- Antivirales: Efavirenz, ritonavir, indinavir.
- Anticoagulantes: Warfarina, acenocumarol

- Inmunosupresores: ciclosporina, tacrolimus,
- Bloqueantes canal del calcio (verapamilo, diltiazem, nifedipino).
- Alcaloides de la vinca
- Otros: sulfonilureas, benzodiazepinas, digoxina.
- Hierba de San Juan o hipérico
- Zumo de pomelo

EFFECTOS ADVERSOS

Los efectos adversos más frecuentes que no significa que aparezcan en todos los pacientes son:

- Dolor de cabeza
- Náuseas y vómitos
- Febrícula
- Alteraciones hepáticas.

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avise rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar...).
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre > 38°C, dificultad al orinar.
- En caso de sobredosis.

CONSERVACIÓN

Mantenga el medicamento en su envase original a temperatura ambiente, protegido de la luz y de la humedad

CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

Una vez abierto el envase tiene una validez de 4 semanas.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento solo se puede conseguir a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital.

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de las cápsulas

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

Notas:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

COMO CONTACTAR

Teléfono Farmacia:

Horario:

LOGO HOSPITAL



INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

POSACONAZOL

Noxafil®

Jarabe 200 mg/5ml 105 ml

Nombre del paciente:

Fecha: