

POSOLOGIA

PROCARBAZINA se administra por **via oral**

La dosis recomendada es según prescripción médica



¿COMO se debe TOMAR Procarbazina?

- Puede tomarse con o sin alimentos, preferiblemente por la noche.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma
- Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar, ni disolverlas.
- Mantenga siempre el mismo horario

¿QUÉ hacer si...?:

- Si se ha olvidado de tomar una dosis: tómela lo antes posible. Si faltan menos de 2 horas para la siguiente toma espere y no doble nunca la dosis.
- Si vomita, únicamente repita la dosis si ha transcurrido menos de 1 hora desde la toma.
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

¿Cuándo NO debe tomar Procarbazina?

- Si usted es alérgico a procarbazina así como a cualquiera de los componentes de la cápsula.
- Si está embarazada o en período de lactancia

PRECAUCIONES

- Si tiene enfermedad hepática o renal grave.
- Si tiene enfermedad del corazón, diabetes, epilepsia, tiroides o parkinson.
- Adopte 2 medidas anticonceptivas si usted o su pareja puede quedarse embarazada y manténgalas hasta 6 meses después de haber finalizado el tratamiento.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.

INTERACCIONES

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Antigripales: pseudoefedrina, fenilpropanolamina

Evite tomar bebidas alcohólicas durante el tratamiento y hasta 10-14 días después de haber finalizado el tratamiento.

Los alimentos con alto contenido en tiramina y cafeína pueden aumentar la presión arterial. Se recomienda evitar los quesos fermentados, embutidos, carne o pescado ahumados, vino o cerveza hasta una semana después de finalizar el tratamiento.

EFFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos mas frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Náuseas, vómitos, diarrea
- Caída leve del cabello.
- Cambio color de la piel
- Llagas en la boca. Pérdida del apetito.
- Dificultad para respirar
- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Debe tomar medidas higiénicas.
- Dolor de cabeza.
- Puede aumentar el riesgo de hemorragias, tenga cuidado con los utensilios que corten.

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave: (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar...).
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre > 38°C, dificultad al orinar.
- Signos de sangrado como heces negras, sangre en la orina o hematomas importantes.
- Convulsiones
- Dolor en el pecho, dolor de cabeza y sensibilidad a la luz
- En caso de sobredosis

CONSERVACIÓN

Mantenga las cápsulas en su envase original, a temperatura ambiente, protegidos de la luz y de la humedad.

CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de las cápsulas.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

Notas:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.

COMO CONTACTAR

Teléfono Farmacia

Horario

Logo Hospital



INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS



PROCARBAZINA

Natulan®

Cápsulas 50 mg

Nombre paciente:

Fecha: