

POSOLOGIA:

VINORELBINA se administra por vía oral.

La dosis recomendada es según prescripción médica.



¿CÓMO se debe TOMAR Vinorelbina?

- Tomar con alimentos, preferentemente por la mañana con el desayuno.
- Recortar el blister por la línea de puntos, sacar el plástico blanco y presionar para sacar la cápsula.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de la toma.
- Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar, ni disolverlas
- Mantenga siempre el mismo horario.

¿QUÉ hacer si...?

- Si una cápsula se abre o se estropea, evite el contacto del líquido del interior con la piel y los ojos y devuélvela al médico o farmacéutico.
- Si toca el líquido, limpie el área afectada con mucho agua. Si ha masticado, chupado o disuelto por error, enjuáguese la boca con mucho agua. Contacte con su médico.
- Limpie las superficies (suelo, mesa, etc.) que hayan estado en contacto con el líquido de la cápsula con lejía.
- Si se ha olvidado de tomar una dosis: tómela lo antes posible.
- Si vomita no repita la dosis.

¿Cuándo NO debe tomar Vinorelbina?

- Si usted es alérgico a vinorelbina o similares (vincristina o vinblastina) así como a alguno de los componentes de la cápsula como el sorbitol.
- Si está embarazada o en período de lactancia.

PRECAUCIONES:

- Si padece enfermedad hepática grave
- Si ha sufrido alguna enfermedad que afecte de manera importante la absorción intestinal o si se ha sometido a una reducción quirúrgica de intestino o estómago.
- Adopte 2 medidas anticonceptivas si usted o su pareja puede quedarse embarazada.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.

INTERACCIONES:

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicina, especialmente si toma:

- Antifúngicos (para tratar infecciones por hongos): ketoconazol, itraconazol, miconazol, voriconazol.
- Antibióticos: eritromicina, claritromicina, telitromicina, rifampicina.
- Antiepilépticos: fenitoína, carbamazepina, fenobarbital.
- Otros: dexametasona
- Hierba de San Juan o hipérico
- Zumo de pomelo.

EFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos más frecuentes que no significa que aparezcan en todos los pacientes son:

- Cansancio
- Febrícula.
- Caída leve del cabello.
- Dolores musculares y articulaciones, dolor mandibular, pérdida de reflejos.
- Náuseas, vómitos, llagas en la boca, estreñimiento o diarrea.
- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Debe tomar medidas higiénicas.
- Puede aumentar el riesgo de hemorragias, tenga cuidado con los utensilios que corten.

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avisé rápidamente su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar...).
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre > 38°C, dificultad al orinar.
- Signos de sangrado como heces negras, sangre en la orina o hematomas importantes.
- Dolor de garganta
- En caso de sobredosis.

CONSERVACIÓN

Mantenga las cápsulas en su envase original dentro de la **nevera** (entre 2 y 8°). **NO CONGELAR**



CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento solo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital.

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de las cápsulas.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

DIAS	Nº CAPSULAS		Frecuencia
	20 mg	30 mg	

Notas:

Este tríptico **NO** contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico.

COMO CONTACTAR

Teléfono Farmacia

Horario

Logo Hospital



INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS



VINORELBINA

NAVELBINE®

Cápsulas de 20 y 30 mg.

Nombre del Paciente:

Fecha: