

INDICACIÓN

EXJADE se utiliza para eliminar el exceso de hierro del organismo.

POSOLOGIA

EXJADE se administra por **vía oral**.

La dosis recomendada es según prescripción médica.

¿CÓMO se debe TOMAR EXJADE?

-Se toma una vez al día, con el estómago vacío, al menos 30 minutos antes de comer.

-Intente tomarlo siempre a la misma hora cada día.

-Eche los comprimidos en un vaso de agua o zumo de naranja o manzana y agite hasta que se disuelvan. Quedará un líquido turbio. Beba todo el contenido del vaso. Añada un poco más de agua o zumo a los restos que queden en el vaso y vuelva a beber.

-No disuelva los comprimidos en bebidas gaseosas o leche.

-Los comprimidos no se deben masticar ni tragar enteros.

¿QUÉ hacer si...?

- Si se ha olvidado de tomar una dosis, hágalo lo antes posible. Si han pasado más de 12 horas espere a la siguiente toma.

- No doble nunca la dosis.

- Si vomita, únicamente repita la dosis si ha transcurrido menos de 1 hora desde la toma.

- En caso de duda, coméntelo con su médico o farmacéutico.

Cuándo NO se debe tomar EXJADE?

- Si usted es alérgico a deferasirox o a cualquiera de los otros componentes de EXJADE, como lactosa.
- Si tiene problemas de riñón.
- Si actualmente está tomando otro medicamento quelante del hierro.
- Si está embarazada o en período de lactancia.

PRECAUCIONES

- Si tiene problemas de hígado.
- Si tiene problemas de corazón.
- Antiácidos que contengan aluminio: deben tomarse en otro momento del día.

INTERACCIONES

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Analgésicos, antiinflamatorios (AINEs), corticoides, bifosfonatos orales.
- Anticoagulantes.
- Colestiramina.
- Ciclosporina, simvastatina, anticonceptivos hormonales, bepridilo, ergotamina, replaginida.
- Rifampicina, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, ritonavir.

EFFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, hinchazón, estreñimiento, mala digestión
- Úlceras y hemorragias digestivas
- Erupción en la piel, cambio en el color de la piel
- Dolor de cabeza, mareo
- Fiebre
- Dolor de garganta
- Hinchazón en brazos y piernas
- Ansiedad, alteración del sueño, cansancio
- Disminución de audición o visión

Comente con su médico o farmacéutico si presenta alguno de éstos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Reacción alérgica grave (enrojecimiento de la piel, dificultad para respirar, hinchazón en cara o garganta...).
- Disminución pronunciada del volumen de orina
- Signos de problemas de hígado (color amarillento de piel o ojos, orina oscura y dolor abdominal)
- Signos de sangrado, heces negras, vómitos con sangre.
- Pérdida parcial de visión, visión borrosa o pérdida de audición.
- En caso de sobredosis.

CONSERVACIÓN

Mantenga los comprimidos en su envase original a temperatura ambiente, protegidos de la luz y de la humedad.

CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital.

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de los comprimidos.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

Nº COMPRIMIDOS/DÍA	
125mg	500mg

Notas:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

CÓMO CONTACTAR:

Teléfono Farmacia:

Horario:

LOGO HOSPITAL



INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS



DEFERASIROX

Exjade®

Comprimidos 125 y 500 mg

Nombre del paciente:

Fecha:

Diciembre 2010