

POSOLOGIA

ERLOTINIB se administra por **via oral**
La dosis recomendada es según prescripción médica



¿CÓMO se debe TOMAR Erlotinib?

- Debe tomarlo sin alimentos, es decir, 1 hora antes o dos horas después de comer.
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma
- Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua, sin masticar, ni chupar en la boca.
- Si tiene problemas para tragarlo puede disolverlo en un poco de agua y tomarlo inmediatamente.
- Mantenga siempre el mismo horario

¿QUÉ HACER SI...?:

- Si se ha olvidado de tomar una dosis: tómela lo antes posible. Si han transcurrido más de 12 horas espere a la siguiente toma y no doble nunca la dosis.
- Si vomita, únicamente repita la dosis si ha transcurrido menos de 30 minutos desde la toma.
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

¿Cuándo NO debe tomar Erlotinib?

- Si usted es alérgico a erlotinib así como a cualquiera de los componentes del comprimido como lactosa
- Si está embarazada o en período de lactancia

PRECAUCIONES

- Si toma inhibidores de la bomba de protones (omeprazol, pantoprazol...) o antagonistas-H2 (ranitidina).
- Tome los protectores gástricos 4 horas antes o 2 horas después de Erlotinib.
- Adopte 2 medidas anticonceptivas si usted o su pareja puede quedarse embarazada y manténgalas hasta 2 semanas después de haber finalizado el tratamiento.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.
- Se recomienda usar gel de baño sin detergente, cremas hidratantes de avena o aloe vera y champú suave.
- Protéjase del sol con ropa adecuada y crema con filtro solar de protección superior a 15.

INTERACCIONES

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Antifúngicos (para tratar infecciones por hongos): ketoconazol, itraconazol, voriconazol.
- Antibióticos: eritromicina, claritomicina, rifampicina.
- Antivirales: atazanavir, indinavir, nefazodona, nelfinavir, ritonavir, saquinavir.
- Antiepilépticos : fenobarbital. carbamazepina, fenitoína
- Anticoagulantes: warfarina, acenocumarol
- Hierba de San Juan o hipérico.
- Zumo de pomelo

EFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Diarrea
- Náuseas, vómitos
- Enrojecimiento y sequedad de la piel, picor
- Dificultad para respirar. tos
- Mayor susceptibilidad a tener infecciones. Debe tomar medidas higiénicas.
- Dolor, enrojecimiento, o llagas en la boca
- Fatiga, cansancio
- Disminución del apetito
- Pérdida de peso

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave: (enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar...).
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre > 38°C, dificultad al orinar.
- Signos de sangrado como heces negras, sangre en la orina o hematomas importantes.
- Ojos o piel amarillentos
- Oscurecimiento de la orina o heces blanquecinas.
- Dificultad para respirar
- En caso de sobredosis.

CONSERVACIÓN

Mantenga los comprimidos en su envase original, a temperatura ambiente, protegidos de la luz y de la humedad.

CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de los comprimidos.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

Notas:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

COMO CONTACTAR

Teléfono Farmacia

Horario

Logo Hospital



INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

Tarceva® 150 mg
comprimidos recubiertos con película
Erlotinib

Comprimidos
VÍA ORAL



Tarceva® 100 mg
comprimidos recubiertos con película
Erlotinib

Comprimidos
VÍA ORAL



Tarceva® 25 mg
comprimidos recubiertos con película
Erlotinib

Comprimidos
VÍA ORAL



ERLOTINIB

TARCEVA®

Comprimidos 150, 100 i 25 mg

Nombre paciente:

Fecha:

Diciembre 2010