

INDICACIÓN

NABILONA se utiliza conjuntamente con otros fármacos para la prevención de náuseas y vómitos provocados por la quimioterapia

POSOLOGIA

Nabilona se administra por **via oral**.

La dosis recomendada es según prescripción médica.



¿CÓMO se debe TOMAR Nabilona?

- Puede tomarse con o sin alimentos
- Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma.
- Las cápsulas deben tragarse enteras con un vaso de agua, sin masticar, chupar, ni disolverlas.
- Mantenga siempre el mismo horario

¿QUÉ hacer si...?

- Si se ha olvidado de tomar una dosis: tómela lo antes posible y no doble nunca la dosis.
- Si vomita no repita la dosis.
- En caso de duda coméntelo con su médico o farmacéutico.

¿Cuando NO debe tomar NABILONA?

- Si usted es alérgico a Nabilona o derivados del cannabis, así como a cualquiera de los componentes de la cápsula.
- Si está embarazada o en período de lactancia.

PRECAUCIONES:

- Si tiene enfermedad hepática grave.
- Si tiene enfermedad cardíaca.
- Si ha sufrido alguna enfermedad que afecte de forma importante a la absorción intestinal o si se ha sido sometido a una resección quirúrgica de intestino o estómago.
- Adopte 2 medidas anticonceptivas si usted o su pareja puede quedarse embarazada.
- Consulte con su médico o farmacéutico antes de vacunarse.

INTERACCIONES:

Pregunte a su médico o farmacéutico antes de tomar un medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Barbitúricos
- Analgésicos opiáceos: morfina, fentanilo
- Benzodiazepinas: diazepam, lorazepam

Nabilona puede potenciar los efectos del alcohol

EFFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes son:

- Somnolencia, insomnio
- Vértigo
- Euforia, dificultad en concentrarse,
- Hipotensión
- Dolor de cabeza
- Visión borrosa,
- Sequedad de boca,
- Náuseas, vómitos,

Comente a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

Avisé rápidamente a su médico si tiene:

- Una reacción alérgica grave: enrojecimiento de la piel, dificultad al respirar...).
- Signos de infección como tos, escalofríos, fiebre > 38°C, dificultad al orinar.
- Excesiva somnolencia, visión borrosa o alteración del nivel de consciencia.
- Convulsión
- En caso de sobredosis.

CONSERVACIÓN

Mantenga las cápsulas en su envase original a temperatura ambiente, protegidas de la luz y de la humedad

CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de las cápsulas.

RECOMENDACIONES AL PACIENTE

DIAS	Nº CÁPSULAS		Frecuencia
	1 mg	___ mg	

Notas:

Este tríptico NO contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

CÓMO CONTACTAR

Teléfono Farmacia:

Horario:

Logo Hospital



INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

NABILONA
NABILONE®
Cápsulas de 1 mg

Nombre del Paciente:

Fecha:

Diciembre 2010