

## INDICACIÓN

ROMIPILOSTIM se utiliza para aumentar el número de plaquetas.

## POSOLOGIA

Romiplostim se administra por vía **subcutánea** (debajo de la piel).

La dosis recomendada es según prescripción médica.

## ¿CÓMO se debe ADMINISTRAR Romiplastim?

1. Lávese las manos cuidadosamente.
2. Quitar el tapón blanco del vial de Romiplostim y limpiar con alcohol. Abrir el vial de agua para inyección y limpiar con alcohol.



3. Extraer con una jeringa (con graduaciones de 0,01ml) la cantidad de agua para preparación de inyectables necesaria para reconstituir el vial:

- **0,72ml para el vial de 250mcg**

- **1,2ml para el vial de 500mcg**

(extraer un poco más de agua de la necesaria y en posición vertical quitar las burbujas de aire y expulsar agua hasta la medida justa)



4. Pinchar el vial de Romiplostim con la jeringa que contiene el agua e inyectar despacio el agua dentro del vial.



5. Agitar suavemente el vial con movimientos circulares hasta su disolución (2 min. aprox.) La solución debe quedar transparente e incolora. **(No agitar ni sacudir vigorosamente)**




6. Limpiar el vial Romiplostim con alcohol. Con una jeringa (con graduaciones de 0,01ml) extraer la cantidad de Romiplostim que le ha prescrito el médico. Extraer un poco más de líquido del necesario y en posición vertical quitar las burbujas de aire y expulsar líquido hasta la medida justa). Saque la aguja y deséchela.



7. Insertar la aguja para inyección subcutánea en la jeringa.



8. Escoger el lugar para pinchar y limpiar con alcohol. Pellizque la piel entre los dedos pulgar e índice, sin apretar, e introduzca la aguja con un ángulo de 45° e inyecte lentamente el líquido.



9. Después de inyectar, retire la aguja y deje de pellizcar la piel. Desinfecte la piel con alcohol. Para cada administración cambiar el lugar de inyección, alternando entre la parte exterior de la parte superior del brazo, el abdomen (a más de 2cm del ombligo) y la parte frontal del muslo.

No reconstituir con Suero Fisiológico o agua.

## ¿QUÉ hacer si...?

- Si se ha olvidado de administrar la inyección, hágalo lo antes posible. Si han transcurrido más de 24 horas comuníquelo a su médico o farmacéutico.
- No doble nunca la dosis.

## Cuándo NO se debe administrar Romiplostim?

- Si usted es alérgico a Romiplostim, así como a cualquiera de los componentes de la solución.
- Si es alérgico a otros medicamentos producidos mediante tecnología del ADN que utiliza *E.coli*.

## PRECAUCIONES

- Si está embarazada o en periodo de lactancia.

## INTERACCIONES :

Consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar cualquier medicamento, vitamina o planta medicinal, especialmente si toma:

- Corticosteroides, danazol, azatriopina, inmunoglobulinas intravenosas (IGIV) e inmunoglobulinas Anti-D.

## EFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos más frecuentes, que no significa que aparezcan en todos los pacientes, son:

- Dolor de cabeza, migraña.
- Vértigo, mareo, insomnio, debilidad
- Dolor muscular, en las articulaciones, huesos, en las extremidades, en la espalda.
- Hormigueo, entumecimiento o hinchazón en manos y pies. Piernas hinchadas.
- Náuseas, diarreas o estreñimiento, dolor abdominal, indigestión, dolor de estómago.
- Picor, erupción, enrojecimiento de la piel.
- Dolor o irritación en el lugar de inyección.
- Cansancio, síntomas gripales.
- Hematomas, contusiones, pequeños sangrados.

Comente con su médico o farmacéutico si presenta alguno de éstos efectos adversos o cualquier otro que crea que puede estar relacionado con la medicación.

## Avise rápidamente a su médico si tiene:

- Reacción alérgica grave (enrojecimiento de la piel, dificultad para respirar,...).
- Signos de sangrado, heces negras, sangre en la orina y/o hematomas importantes.
- Signos cardíacos y respiratorios como ansiedad, palpitaciones, dolor en el pecho, dificultad para respirar.
- Signos de trombosis como dolor, calor, edema, cambio de color de una pierna.
- En caso de sobredosis.

### CONSERVACIÓN

Mantenga las inyecciones en su envase original, **en la nevera** (entre 2 y 8º) y **protegido de la luz**. **NO CONGELAR**



### CADUCIDAD

No utilizar después de la fecha de caducidad indicada en el envase.

### ADVERTENCIAS

Mantenga los medicamentos fuera del alcance de los niños.

Este medicamento sólo puede conseguirse a través del Servicio de Farmacia del Hospital, con la receta que le hará su médico de este Centro.

Devuelva la medicación sobrante a la Farmacia del Hospital.

Las mujeres embarazadas deberán tener especial cuidado en evitar el contacto con el contenido de las jeringas.

### RECOMENDACIONES AL PACIENTE

DÍAS	Nº INYECCIONES		Frecuencia
	250mcg	500mcg	

Notas:

Este tríptico **NO** contiene toda la información de este fármaco y sólo pretende ser un resumen para ayudar al paciente con su tratamiento. No sustituye el prospecto.

Si tiene cualquier duda o precisa más información contacte con su médico o farmacéutico

### CÓMO CONTACTAR:

Teléfono Farmacia:

Horario:

LOGO HOSPITAL



## INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS



## ROMIPILOSTIM

Nplate®

Nombre del paciente:

Fecha:

Diciembre 2010